

La pisciculture, un élevage parmi d'autres ?

Dossier réalisé par Transrural Initiatives, avec le soutien de Gilles Cauvin (ingénieur halieute)

Quoi de commun entre un poisson et un poulet ?

Plus qu'il n'y paraît ! Tous deux sont nourris aux farines de poisson, soignés aux antibiotiques, parqués de manière plus ou moins dense dans des cages, bassins ou enclos...

FARINES DE POISSON !!!



En quelques dizaines d'années, le développement de l'élevage de poissons a pris les mêmes voies que celui de ses cousins terrestres.

Au niveau international, la pisciculture est considérée comme une alternative à l'épuisement des ressources halieutiques. Mais s'étant calquée sur les critères de l'élevage industriel, elle est dorénavant associée à la pollution des milieux aquatiques (p. V), à des nuisances visuelle et olfactive, à la baisse de la qualité des produits - très gras, (p. IV). La méfiance grandit chez les consommateurs et les associations de protection de la nature se mobilisent (p. V).

Réponses apportées par les professionnels aquacoles : «l'aquaculture durable» amorcée par l'interprofession aquacole prend la forme d'une agriculture raisonnée (p. VIII); l'aquaculture biologique et l'aquaculture de qualité se développent (P. VI-VII).

Néanmoins, la pisciculture pose des questions particulières comme la «cohabitation» avec les populations de poissons sauvages : le poisson d'élevage se nourrit de poissons sauvages et contribue donc à fragiliser les écosystèmes aquatiques (P.V), les poissons d'élevage sont améliorés grâce à la biodiversité sauvage (p. VIII), ils assurent le repeuplement des cours d'eau (p. VII) mais menacent, dans le même temps, les souches sauvages en se disséminant dans la nature.

La pisciculture dans le monde

La pisciculture représente 18 % de la production aquatique mondiale. Sa part tend à augmenter, notamment avec l'explosion de la production chinoise.

En 2000, les poissons marins d'élevage représentent seulement 2 % de l'ensemble de la consommation de poissons marins. Par contre, la proportion s'inverse pour les poissons amphibiotes (salmonidés, esturgeons, anguilles) avec 60 %, et pour ceux d'eau douce avec 74 %.

L'augmentation de l'offre de poisson est due presque exclusivement à l'aquaculture qui a augmenté de 150 % en dix ans contre 9 % pour la pêche. Cette croissance a porté aussi bien sur les poissons d'eau douce

(+ 170 %) que marins (+ 190 %) ou amphibiotes (+ 80 %).


L'Asie est la première source de production de poissons d'élevage, essentiellement de poissons d'eau douce (carpe, tilapia). La Chine représente à elle seule 3/4 de la production piscicole mondiale d'eau douce. Cette place est due à une véritable explosion de la production, multipliée par 7 en quinze ans. L'Europe et l'Amérique sont les premières zones d'élevages de salmonidés (saumon et truite) et de poissons marins (bar et daurade).

définitions

L'aquaculture recouvre toutes les productions, élevage et culture, conduites dans l'eau douce ou marine : au delà des poissons, elle englobe les algues, les mollusques et les crustacés. La pisciculture désigne, elle, spécifiquement l'élevage de poissons.

Aquaculture et pêche en 2000 (en millions de tonnes)

Source : Ifremer



L'Affaire «saumon»

L'étude de la revue américaine Science épinglant le saumon d'élevage a défrayé la chronique en Europe. Riposte des européens : les Américains s'enveloppent d'un motif scientifique pour promouvoir le saumon sauvage produit principalement outre atlantique. L'étude américaine souligne en effet la plus grande présence de dioxines et de toxines dans les saumons d'élevage. Cet élément semble acquis pour les chercheurs français alors que ces polluants s'accumulent dans les graisses et que les poissons d'élevage sont plus gras que leurs confrères sauvages. Ainsi, Françoise Medale, directrice à l'Inra en nutrition des poissons, souligne dans un entretien¹ que «Comme toute la chaîne alimentaire marine est polluée et que les saumons d'élevage mangent beaucoup plus, grandissent plus vite et accumulent davantage de réserves que les sauvages, ils sont d'autant plus susceptibles de stocker des polluants.» Mais de préciser que «selon tous les contrôles effectués, les normes sanitaires sont respectées». En effet, les scientifiques français contestent en revanche les niveaux de toxicité et les conclusions de l'étude de Science qui préconise de consommer du saumon d'élevage moins d'une fois par mois. Relayant cet avis, l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) estime ces recommandations injustifiées et rappelle au contraire sa recommandation de manger du poisson deux fois par semaine, pour bénéficier des effets des acides gras Oméga 3.

En règle générale, les produits de la mer représentent un quart des expositions alimentaires aux dioxines, selon une étude de l'Afssa. Mais les données toxicologiques sont difficiles à obtenir chez l'homme, précise l'Agence.

¹<http://www.sudouest.com/>

La France, 3^{ème} producteur piscicole européen

Au sein de l'Union européenne, la France arrive en troisième position en terme de production piscicole, avec 61 000 tonnes, loin derrière la Grande Bretagne (145 000 t.) et juste après l'Italie. Sur les dix dernières années, la croissance de la pisciculture française a été de 3% par an (en volume), ce qui reste inférieur à la moyenne de l'Union européenne (+ 13%), et très loin derrière la Grèce (+ 30%). La France occupe cependant une position particulière avec la dominance de la salmoniculture en eau douce. Le développement des élevages de saumons en Ecosse et en Irlande ainsi que ceux de bars et de daurades en Grèce privilégie la pisciculture marine.


Dans notre assiette

Un poisson sur quatre consommés en France vient de l'élevage. Cette proportion est la plus forte d'Europe. Ainsi, sur un étal de poissonnier, une truite provient à coup sûr d'un élevage, pour un saumon, la part de poissons d'élevage est de 90 %, pour une daurade, 80 %, pour un bar 55 %.

Le paysage aquacole français

La pisciculture de truites est largement prépondérante en France. Elle représente 43 000 tonnes en 2002 contre 12 000 tonnes pour la pisciculture d'étang et 6 000 tonnes pour les élevages d'espèces marines.

La France est le premier producteur mondial de truites, poisson particulièrement adapté aux eaux nationales. On compte environ 800 sites de production de cette espèce qui appartiennent à quatre cents entreprises. Excepté une centaine de structures de petites tailles qui travaillent sur le repeuplement



Typologie de la pisciculture française

La pisciculture française peut être découpée en quatre familles :

- > **La salmoniculture en eau douce**, caractérisée par des élevages intensifs en bassin à fort débit d'eau avec comme espèces principales la truite arc-en-ciel et la truite fario.
- > **La pisciculture d'étangs**, activité extensive sans maîtrise du renouvellement en eau, qui concerne avant tout la carpe mais aussi le brochet, le sandre, la tanche ou le black-bass.
- > Récemment, **des élevages de poissons en eau douce** utilisant des techniques plus intensives en bassins et avec une maîtrise de l'eau sont apparus pour certaines espèces comme le silure et l'esturgeon.
- > **La pisciculture marine**, qui est pratiquée en cages en mer ou en bassins à terre avec pompage d'eau de mer, produit du bar, de la daurade royale, du turbot.

Source : Ofimer

des rivières et la pêche de loisir, ces entreprises destinent leurs produits à une cinquantaine d'ateliers de production. Les exploitations piscicoles sont disparates, d'unités familiales à des entreprises produisant plus de 100 tonnes annuellement. La tendance est néanmoins à la concentration et à l'intégration. Ainsi, les deux principaux ateliers de transformation basés dans les Landes – Aqualandes et Viviers de France – ont intégré chacun une vingtaine d'entreprises. « Ces ateliers respectent la loi des 20% d'entreprises qui concentrent 80% de la production », note Marine Levadoux du Cipa¹.

La production de truites, assez ancienne, a connu un véritable essor dans les années 1970 grâce à l'amélioration des aliments : le broyat de poissons est abandonné pour les farines et l'huile de poissons, beaucoup plus facilement utilisable. Ce secteur est aujourd'hui en crise. « En dix ans, une centaine de structures ont disparu [soit 20%], proportion qui se retrouve dans la baisse de la production », précise Marine Levadoux. La truite trouve un maigre succès auprès du consommateur : sa gamme est limitée et elle subit largement la concurrence du saumon. La France en est en effet le premier consommateur mondial.

La pisciculture d'étang concerne 9 000

exploitants, essentiellement des pluriactifs pour qui la pisciculture n'est qu'une activité de complément ; seules 75 entreprises la déclarent comme activité principale.

«Une seule entreprise concentre 80% de la production française de turbot»

La pisciculture marine est beaucoup plus récente. Elle s'est développée à la fin des années 1980 et est aujourd'hui concentrée dans 52 entreprises. « Pour le bar, AquaNord représente la moitié de la production nationale et France Turbot 80% de la production de turbot », illustre Marine Levadoux. Les productions sont principalement destinées à l'exportation, à la différence de la truite destinée surtout à la consommation intérieure. Sur la méditerranée, les structures sont plus petites. Les productions de bars et daurades en cages flottantes s'adressent souvent directement aux restaurateurs.

Aujourd'hui, le développement de ce secteur est confronté à la pénurie de sites. Le littoral subit déjà une pression foncière importante. De plus, les désagréments liés à l'élevage se marient mal avec les activités de tourisme en particulier.

¹Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture

L'alimentation des poissons d'élevage questionne les ambitions de l'aquaculture

Pour nourrir un kilo de poissons d'élevage, il faut pêcher trois à quatre kilos de poissons sauvages. Ce mauvais ratio résume l'enjeu de l'aquaculture : transformer son système d'alimentation.

L'alimentation des poissons d'élevage repose sur... des poissons. Les espèces élevées sont principalement carnivores : elles ont des besoins importants en protéines et en acides gras poly-insaturés fournis par les huiles. Cela pose le problème du développement de la pisciculture qui s'est accompagné d'une pêche minotière de masse pour fournir farines et huiles de poissons.

L'alimentation «durable» des poissons carnivores d'élevage reste une interrogation. L'interdiction des farines d'animaux «terrestres» par le Cipa depuis 1996 a été appréciée à l'aune de la crise de la vache folle comme une mesure de précaution nécessaire. Mais le recentrage vers la pêche industrielle ne va pas de soi. Interrogé sur l'impact de cette production de farine de poissons sur l'écosystème marin, M. Sabaut, président du Syndicat professionnel pour la promotion aquacole, réplique que «c'est un faux problème : les farines destinées à l'aquaculture ne représentent rien en France par rapport aux 22 millions de tonnes d'aliments destinés à l'élevage !» (voir p. V). De plus, si les tonnages semblent marginaux à l'échelle de la France, c'est loin d'être le cas à l'échelle du globe. Le développement de la pisciculture en Asie pourrait absorber la moitié de la production mondiale de farine de poissons ce qui surenchérirait l'approvisionnement. Or, plusieurs études s'accordent sur l'épuisement de cette ressource (p. V).

Les alternatives à la pêche minotière ne sont pas encore trouvées

La recherche aquacole concentre donc ses efforts sur l'élaboration d'aliments d'origine végétale. Nombre de produits

végétaux sont déjà utilisés avec succès : tourteaux de soja, blé, colza, etc. Cependant, si la substitution des protéines animales en protéines végétales semble possible, celle des huiles ne l'est pas : les poissons sont incapables de synthétiser eux-mêmes des acides gras poly-insaturés (comme les oméga 3). Sans eux, le poisson présente des taux de mortalité importants. Et les consommateurs de poissons voient les qualités santé (les oméga 3 permettent de diminuer les maladies coronariennes) et organoleptique disparaître de leur assiette.

Jusqu'à un passé récent, l'effort de recherche en aquaculture s'est aussi porté sur la manière d'économiser des protéines. Les chercheurs en nutrition ont mis au point des formules alimentaires enrichies en lipides qui permettent de fournir une bonne partie de l'énergie et d'épargner des protéines. Si cette modification du régime n'est pas possible pour certaines espèces comme le turbot, en revanche le saumon et la truite l'acceptent bien. Mais ces régimes, qui peuvent contenir jusqu'à 40 % de lipides, ont pour conséquence de rendre les poissons très gras...

Une solution pourrait être une pisciculture de poissons herbivores (la carpe notamment). Mais la faible image de ces poissons auprès des consommateurs occidentaux et son corollaire, la faible valeur ajoutée du produit, semblent réhibitoires pour les producteurs et les chercheurs. Et ce, malgré un rapport de 2,5 à 5 kilos (selon les sources) de poissons sauvages pour nourrir un kilo de poisson d'élevage : «Notons que l'on est très loin de l'objectif initial de l'aquaculture énoncé par la FAO dans les années 70 qui visait à fournir des protéines au monde entier et de supprimer ainsi la faim dans le monde. Très rapidement, au lieu de concentrer les efforts sur des espèces herbivores par exemple, ce sont des espèces à haute valeur ajoutée qui

ont été produites, espèces inaccessibles aux pays du tiers monde», souligne David Benhaim, de l'Intecmer/Cnam.



source : www.sea-river-news.com

À explorer

Alors quelles alternatives ? L'idéal serait semble-t-il de recourir aux poissons «by catch» capturés par les bateaux qui pêchent des espèces pour la consommation humaine. Ces prises accidentelles peuvent se révéler importantes. Pour l'heure, elles encombrant les pêcheurs qui les rejettent à la mer. Leur valorisation pose cependant le problème idoine de la pêche industrielle dès lors qu'elles deviennent rentables.

Une autre voie explorée est celle d'élevages de «poissons fourrages». Cependant outre le coût réhibitoire, peu d'espèces de poissons sont aujourd'hui élevées, ce qui risque de rendre, par exemple, la truite «anthropophage» ! Les agriculteurs bio évoquent la possibilité de farines d'insectes ou de larves. La filière est à inventer. Enfin, la crise de la vache folle étant derrière, l'utilisation de déchets d'abattoirs d'animaux «terrestres» pourrait revenir d'actualité.

Le poisson d'élevage malmène son cousin sauvage

Entretien avec Gilles Huet, Eau et Rivières de Bretagne.

Transrural Initiatives : Quels sont les problèmes environnementaux posés par l'aquaculture ?

Gilles Huet : Pour l'aquaculture intensive, les problèmes sont de quatre ordres. D'abord, dans le cadre de la pisciculture en eau douce, la dérivation des cours d'eau vers les établissements d'élevage réduit le débit des rivières. Ce prélèvement transforme le milieu au détriment des espèces sauvages. Ensuite, ces élevages émettent des pollutions dans l'environnement, eau douce ou marine. Les déjections et autres éléments produits par le métabolisme des poissons sont déversés dans le milieu naturel, en grande concentration puisque les densités de

poisson sont importantes. A cela s'ajoutent des produits chimiques : les produits médicamenteux et les produits de désinfections des bassins, nécessaires à forte dose dans des élevages industriels. Ces élevages font courir également les risques sanitaires aux espèces sauvages. Le transfert de gènes pathogènes par l'eau se fait très facilement et le risque de contamination est réel. Enfin, le dernier problème est d'ordre génétique, avec la diffusion dans le milieu naturel d'espèces d'élevage échappées des bassins ou des cages. Or ces espèces ont généralement des caractéristiques dominantes par rapport aux espèces sauvages, comme une capacité de

reproduction plus élevée ou une acceptabilité plus grande d'un milieu dégradé. Les animaux sélectionnés se substituent alors facilement aux poissons sauvages.

TRI : Peut-on mesurer ces différents impacts ?



G. H. : On constate en effet une dominante d'espèces d'élevages à l'aval de fermes piscicoles. Plus largement, l'Inra a conduit une étude sur les impacts cumulés de la pisciculture dans le bassin versant du Scorff (Morbihan). Il a en particulier mentionné une baisse de la densité des juvéniles de saumon sauvage de l'ordre de 20 %.

A quoi tu songes, la truite ?

Comme pour les animaux «terrestres», l'élevage de poissons pose la question de leur bien être. Les indicateurs, qu'il s'agisse de volailles, porcs ou truites, sont similaires. Les facteurs susceptibles de favoriser ou de nuire au bien être des poissons sont la qualité de l'eau, l'alimentation, la lumière, les manipulations, la densité de l'élevage et l'adéquation de l'équipement (cages en mer, bassins et étangs en eau douce).

La qualité de l'eau se mesure notamment par la quantité d'oxygène ou au contraire de CO₂ dissous, de déchets en suspension et l'abaissement du pH. Une densité trop forte de poissons fait baisser l'oxygène disponible mais une sur-oxygénation artificielle est aussi préjudiciable. On mesure le stress et l'agressivité des poissons par les morsures qu'ils s'infligent. Comme pour l'élevage de poules ou de cochons, le bien être est associé à la performance : moins d'animaux malades, meilleure prise de poids ou encore baisse de la mortalité.

Principales espèces élevées en France

ESPECES	POIDS	DUREE D'ELEVAGE	TYPE D'ELEVAGE
BAR 	Poisson de 300/450 g	24 mois	Bassin à terre : mer du Nord et côte atlantique
DORADE 	Poisson de 1 kg et +	30 mois	Cages flottantes en mer méditerranée
TURBOT 	Poisson de 800 g Poisson de 1,5 kg	18 mois 24 mois	Bassin à terre : sur la façade atlantique
ESTURGEON 	Poisson de 700 g Caviar	14 mois 7 ans pour obtenir un poisson mature	Etang ou en bassin par dérivation d'un cours d'eau
TRUITE FARIO 	Poisson de 250 à 800 g	16 mois	Bassin, par dérivation des rivières
TRUITE ARC-EN-CIEL 	Poisson de 250 g Poisson de 5 kg	12 mois 24 mois	Bassin, par dérivation des rivières

Source Cipa

L'aquaculture n'est pas l'avenir du poisson

En février 2003, l'organisation écologique WWF a publié un rapport sur l'utilisation des ressources marines dans l'alimentation des poissons. WWF alerte sur le fait qu'un tiers du produit des pêches mondiales est destiné à être transformé en aliments d'élevage. Il s'agit de petits poissons tels que l'anchois, la sardine, le maquereau, le hareng et le merlan (déjà dénommés «poissons industriels»). Le développement industriel de cette pêche au large des côtes ouest d'Amérique du Sud et d'Europe du Nord a permis d'approvisionner les élevages de l'ensemble du globe : un tiers vers les

élevages de poissons, le reste vers les élevages industriels de volailles et porcs. Trois pays - le Chili, le Danemark et la Norvège - se sont spécialisés dans ces pêches. La FAO¹ a estimé en 2001 que les pêcheries au large des côtes péruviennes et chiliennes étaient «*totalemt exploitées*». Les pêcheries de l'Atlantique du nord-est, qui constituent une autre source d'approvisionnement importante de l'industrie du poisson, étaient considérées comme complètement exploitées en 1983 et surexploitées en 1994. Selon le WWF, «*ces espèces sont indispensables à l'écosystème marin*».

Elles nourrissent d'autres espèces de poissons, d'oiseaux et de mammifères. Une forte exploitation signifie moins de nourriture pour les morues, les aigleflins et les thons rouges, ainsi que les oiseaux de mer - macareux moines par exemple - et certains mammifères marins comme les orques.» Ironie du sort alors que l'aquaculture était présentée comme une solution pour réduire la pression sur les milieux marins...

Rapport téléchargeable sur <http://www.panda.org/downloads/marine/foodforthoug.pdf>

¹Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation

L'aquaculture biologique fait son apparition

Lors d'un séminaire européen organisé par la Fédération nationale de l'agriculture biologique (Fnab) et leur homologue anglais, la Soil Association, en novembre 2003, les protagonistes de la bio ont dressé un état des lieux de l'aquaculture biologique en Europe. C'est sans doute une des filières biologiques les moins développées et les moins connues. On ne recense en France guère plus de piscicultures biologiques que de doigts dans la main.

Le Royaume-Uni et l'Irlande produisent la quasi-totalité du saumon biologique. L'élevage de truites bio est davantage réparti avec un peloton de tête regroupant le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Suisse.

La pisciculture biologique n'a pas encore défini de cahier des charges européen qui harmoniserait les référentiels nationaux. Les divergences portent notamment sur la densité de poissons à l'intérieur des élevages et la taille de ces élevages, chacun justifiant son point de vue en fonction des caractéristiques locales. Si à l'instar des agriculteurs bio, les aquaculteurs bio français préconisent des tailles d'élevages réduites, les Anglais affichent une plus grande libéralité au motif que leurs élevages sont «off shore», au large des côtes. De ce fait, traversées par des courants qui diluent la pollution organique jusqu'à la rendre quasi nulle, ces grosses unités apparaissent moins nuisibles à l'environnement.

Estimation de la production des élevages bio en Europe en 2003

Espèces	Truite	Saumon	Truite de mer	Dorade et bar	Carpe
Quantités (tonnes)	1250 t	6755 t	30 t	190 t	170 t

Source : Compte rendu du séminaire de pisciculteurs biologiques européens.
Fnab - 40 rue de Malte - 75011 Paris.

La stratégie communautaire pour une aquaculture durable

Fin 2002, la commission européenne publiait un rapport sur l'aquaculture précisant les axes pour la rendre plus durable.

Le développement de l'aquaculture en Europe s'est appuyé sur le soutien financier de l'Union via l'Ifop¹. Parallèlement, Bruxelles s'est progressivement dotée d'un arsenal juridique. Cependant, constatant le ralentissement du développement de ce secteur et la mauvaise image qu'en a l'opinion, la Commission se donne pour objectif de le restaurer. La vigilance se porte sur la saturation du marché, différentes filières aquacoles ayant connu de fortes baisses de prix depuis les années 1990. L'autre défi se situe dans l'équilibre entre viabilité économique, respect de l'environnement et qualité des produits. Il s'agit enfin de stabiliser les emplois.

Les objectifs de la Commission sont :
- L'emploi avec une prévision d'aug-

mentation de 8000 à 10 000 salariés à plein temps d'ici 2008. Cette hausse se porterait essentiellement sur l'élevage de poissons marins ou de mollusques, comme secteurs de substitution à la pêche.

- Parallèlement la production devrait croître de 4% par an avec un soutien particulier à l'élevage de mollusque, de nouvelles espèces (poissons herbivores, algues) et de productions sous label de qualité, notamment biologique et «écologique».
- Concernant la gestion de l'espace, la Commission soutient la recherche en matière de systèmes de circulation de l'eau, le «transfert des fermes aquacoles vers des zones de moins grande valeur paysagère» (sic) pour l'aquaculture d'eau douce et le

Sportives et écolos, les

Il y a le poulet de batterie et celui nourri au grain, en plein air et libre.

Il y a la truite trempée dans l'eau tiède,

boulimique et stressée et celle qui ondoie dans les eaux vives de bassins d'altitude, sans nager nageoires contre nageoires. Où ?

Par exemple, chez Monsieur Jean Harispe, pisciculteur à Saint Étienne de Baigorry.

Transrural Initiatives : Qu'ont-elles de spécifiques vos truites des Pyrénées ?

Jean Harispe : Notre leitmotiv : la qualité. Les qualités du poisson se reconnaissent à la faible teneur en matière grasse (moins de 12%) sur-

développement d'élevages «off shore» (cages en haute mer ou «radeaux pour mollusques»).

- Enfin, elle invite les acteurs des filières aquacoles à adopter de codes de bonnes pratiques et de bonne conduite pour rassurer les consommateurs et réduire les distorsions de concurrence entre producteurs.
- En matière environnementale, la Commission envisage d'intégrer la pisciculture intensive dans la réglementation sur les activités potentiellement très polluantes au même titre que les élevages porcins et volailles.

Source : Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européens, référence COM (2002) 511 final, publié le 19/09/2002.

¹ Instrument financier d'orientation de la pêche.

truites des Pyrénées

tout comparativement aux poissons qui ont une croissance poussée. Ici on ne force pas : on obtient une truite de 200 gr en 13 mois avec une densité faible de 50 kg/m² (contre 120 kg/m² en élevage intensif). La dénomination «truites des Pyrénées» est une façon de se démarquer, de faire valoir cette qualité car elle induit des coûts de production supérieurs.

TRI : Êtes vous aussi sensible à l'environnement ?

J. H. : C'est le deuxième objectif : prouver que la qualité permet de préserver l'environnement. Nous faisons attention aux rejets. L'eau est de qualité 1A, la meilleure, avant comme après les bassins. On a six contrôles par an, dont quatre en période d'étiage. Nous adhérons à un groupement de défense sanitaire. Notre élevage est indemne de maladies virales et nous nous fournissons en œufs dans une région toute proche. Nous adhérons également au Club de la

charte des salmonidés de repeuplement [cf. ci-dessous, Ndlr].

TRI : Comment êtes vous organisé ?

J. H. : Nous sommes un groupement (GIE) de 20 pisciculteurs du pays basque en zone de montagne. La région a une longue tradition piscicole puisque la première pisciculture date de 1930 et la dernière a vingt ans. Nous produisons 2500 tonnes de truites. On a arrêté le saumon car on n'a aucune force comparé aux Norvégiens. Et puis, les pêcheurs vous le diront, les eaux ici, sont des eaux à truites. Les bassins sont alimentés par des eaux de torrents tumultueuses. La traçabilité est complète. L'alimentation est à base de farine de poisson et de soja non OGM. Les entreprises sont toutes des petites structures qui emploient une à cinq personnes. En tout nous représentons 70 emplois.

TRI : Quels sont vos débouchés ?

J. H. : Les grandes surfaces dont les

enseignes mettent en avant la qualité, les collectivités, la restauration collective et la vente au détail. Nous faisons la transformation : filetage, éviscération, fumaison... Chaque pisciculteur organise sa distribution, mais il y a beaucoup d'entraide.

TRI : Comment appréciez-vous la conjoncture ?

J.H. : Elle est difficile. Ces derniers mois, nous subissons le contre coup de la polémique sur le saumon. La profession n'a pas suffisamment démarqué les produits de qualité des produits industriels. C'est pourtant son boulot. Il va falloir un gros travail de revalorisation pour redonner confiance.



Un débouché à part entière : le repeuplement

Une petite exploitation de deux personnes, mère et fils, produit des truites dont la moitié va au repeuplement des rivières et lacs.

Au sud de Clermont-Ferrand, Françoise Démonet produit 10 tonnes de truites par an. Autant dire peu. Alimenté par des eaux de source volcaniques et par la Veyre, ses bassins ont une température constante de 8,5°C. Preuve de la qualité de ses poissons, elle est membre du Club de la charte des salmonidés de repeuplement (CCSR), lequel réunit depuis 1995 les pisciculteurs agréés pour «repeupler» les rivières. «Leur charte est stricte et les contrôles sont effectués par Veritas (organisme de certification) deux fois par an», insiste Mme Démonet.

Ce débouché concerne 50% de sa production : les fédérations de pêche achètent les poissons qui sont déversés dans les cours d'eau avant la saison de pêche. «Cette pratique vieille d'au moins 50 ans, résulte d'une mauvaise gestion des populations de pois-

sons sauvages qui ont parfois disparu», note Mme Démonet. La Commission européenne reconnaît également le rôle écologique de ces repeuplements. Le CCSR étudie les possibilités pour rapprocher les souches destinées au repeuplement des poissons sauvages. Ce projet devrait notamment regrouper, outre le Club, l'Inra et l'Union nationale pour la pêche. Yves Chauvé, président du CCSR, explique la répartition des tâches : «Les fédérations de pêche dotées de piscicultures devront prélever les souches sauvages et les multiplier dans leurs bassins. Une fois les souches validées par les généticiens de l'Inra, les œufs nous reviendront pour produire les souches à plus grande échelle».

Aujourd'hui, F. Démonet achète les œufs de truites dans des fermes agréées indemnes de maladies virales.

Elle les élève jusqu'au stade «portion», c'est-à-dire adulte. Le repeuplement privilégie les truites Fario pour les rivières, limitant les truites Arc-en-ciel (d'origine américaine) aux étangs et lacs où il y a moins de risques de mélange avec des poissons sauvages.

Bien que ce débouché valorise son travail, la piscicultrice déplore la morosité du secteur. D'abord le marché bradé par les grosses unités intensives. Ensuite la précarité des élevages soumis aux intempéries (orages, grêle), aux nombreux risques sanitaires et aux prédateurs, hérons et cormorans qui peuvent faire des ravages. Mais surtout, note-elle un brin nostalgique, «La truite représentait un plat de fête quand nous étions enfants. Son image a vieilli. Elle ne donne plus envie...».

Sélection ou domestication ?

La sélection génétique des poissons est très récente puisqu'elle a démarré dans les années 1980-1990.

La sélection génétique porte sur un petit nombre de caractères de production, essentiellement la croissance. Depuis quelques années, la résistance aux maladies, problème aiguë dans les élevages industriels, et la qualité des produits sont également pris en compte. Ce dernier point est important pour la truite, qui souffre d'une variabilité de qualité et de goût néfaste à son image. En France, pour les principales espèces d'élevage (salmonidés, bar, daurade, turbot), ce sont les entreprises privées qui ont mis en place des schémas de sélection sur diverses espèces.

«L'obtention de progrès génétique par sélection est un travail de longue haleine. Pour pouvoir sélectionner, il faut d'abord disposer de stocks domestiques «fermés», ce qui signifie que les générations successives sont produites à partir de reproducteurs élevés en captivité. Or, pour beaucoup d'espèces marines, les géniteurs sont encore souvent pêchés en mer : on réintroduit constamment de nouveaux gènes dans le stock, ce qui empêche le travail de sélection», souligne Edwige Quillet, chercheur à l'Inra. A l'inverse, l'existence de populations sauvages est une originalité qui n'existe pas chez les animaux d'élevage «terrestres» ; ces populations peuvent

constituer un réservoir de ressources génétiques pour améliorer les stocks domestiques. Un des objectifs de la recherche consiste d'ailleurs à caractériser la variabilité génétique de ces différentes populations de poissons. «Globalement, la recherche en génétique des poissons est une activité «jeune», qui s'adresse à une très grande variété d'espèces : il reste donc beaucoup à faire. Le génome des poissons reste à ce jour encore mal connu», précise E. Quillet.

Au niveau mondial, on assiste en effet à une diversification très importante du nombre d'espèces concernées par l'aquaculture. Le problème est alors avant tout celui de la domestication (adaptation à des conditions d'élevage).

Quant à la transgénèse, «son intérêt, conditionné à l'acceptabilité sociale, porterait moins sur la croissance que sur des caractères difficiles à améliorer par d'autres voies, telles que la résistance aux maladies», précise la chercheuse.

Néanmoins, des travaux sur des poissons génétiquement modifiés sont menés outre-atlantique : des «supers saumons» avec des capacités de croissance très supérieures aux espèces sauvages sont développés, ce qui pose déjà problème pour leur dissémination dans le milieu naturel.

Bonne entente entre marins pêcheurs et aquaculteurs

Les aquaculteurs et les marins pêcheurs français cohabitent bien. En revanche, les poissons d'élevages subissent la concurrence commerciale de leurs voisins turcs et grecs.

Les pisciculteurs en milieu maritime élèvent dans certains cas leurs poissons dans le même espace que les marins pêcheurs. Les deux corporations vendent également les mêmes espèces. De par le monde, il en résulte des situations plus ou moins conflictuelles entre les deux activités. En France, la concurrence entre pêche et pisciculture marine est maîtrisée.

La pisciculture et la pêche professionnelle marines sont réunies au sein d'une même organisation professionnelle : le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNP-MEM). Cette structure est organisée en comités régionaux et locaux qui couvrent le littoral français. Ainsi, tant à l'échelle nationale qu'au niveau local, la concertation est facilitée.

Généralement, les conflits se posent par rapport à l'occupation de l'espace : or il y a assez peu d'exploitations de pisciculture marine sur le littoral français. Quant à la vente du poisson, l'essor de l'élevage du bar, de la daurade et du turbot dans les années

1990 a fait craindre aux marins pêcheurs qu'ils allaient perdre des parts de marché et subir un préjudice économique. En fait, la production aquacole de ces espèces (environ 7000 tonnes) est trop marginale pour que la vente des produits d'élevage concurrence les produits de la pêche.

Par ailleurs, aujourd'hui le consommateur semble bien faire la différence entre le poisson d'élevage et le poisson sauvage. Il y a donc deux créneaux commerciaux différents. De plus, les poissonniers et les grandes surfaces ont désormais l'obligation d'indiquer l'origine géographique et le mode de production des poissons -même si ce n'est pas toujours respecté-.

En revanche, l'arrivée massive de poissons d'élevage de Turquie et de Grèce tire les prix vers le bas. Dans ces pays les normes sociales et sanitaires sont moins strictes qu'en France.

Personnes interrogées : permanent du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNP-

A la recherche d'une aquaculture durable

Le Cipa, le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, se penche actuellement sur l'élaboration d'une charte de l'aquaculture durable. La réflexion s'appuie sur le nécessaire virage des modes de production dont l'image s'est dégradée au gré des attaques des mouvements environnementalistes et de la critique des consommateurs contre les «poissons de batterie». Entamée depuis 2001, en collaboration avec l'Inra, l'Ifremer et l'Ofimer (Office interprofessionnel des produits de la mer), les administrations, le Conseil supérieur de la pêche et les associations agréées de pêche, la concertation n'a pas encore abouti à un cahier des charges. D'autant que dans plusieurs voies, l'état de lieux de l'existant reste à faire (notamment sur l'usage médicamenteux) et l'appel à la Recherche nécessaire (génétique, alimentation...).

MEM), secrétaire générale du Syndicat français de la pisciculture marine et nouvelle (SFAM), président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de la région PACA, directeur commercial de l'entreprise Les mareyeurs du Sud-est (Nice).