

## **Les systèmes agro-pastoraux économes : savoirs et savoir-faire paysans au service de la reconquête pastorale. Le cas de la Montagne limousine**

*Morsel Nathan, Garambois Nadège*

Depuis une dizaine d'années, des systèmes agro-pastoraux mobilisant tout à la fois prairies permanentes (ou temporaires) et végétations semi-naturelles très variées (landes, tourbières, friches forestières, sous-bois...), sont mis en œuvre par un petit nombre d'éleveurs de la Montagne limousine. Inscrits dans une démarche visant à faire reposer le plus possible l'alimentation du troupeau sur le pâturage et à essayer de limiter les coûts de production, ces systèmes de production particuliers peuvent être qualifiés d'*économes*. Ces systèmes agro-pastoraux économes contrastent avec des exploitations d'élevage sinon inscrites, dans la Montagne limousine, dans un recul du pastoralisme et de la technicité des éleveurs dans la conduite des animaux au pâturage.

La recherche conduite<sup>1</sup> vise ainsi à mieux comprendre comment a évolué l'agriculture de cette petite région et la place des savoirs et savoir-faire des agriculteurs en matière de pâturage et de valorisation des espaces semi-naturels, pour mieux analyser comment ces systèmes agro-pastoraux économes récemment développés s'inscrivent dans ces dynamiques, quelle est la place des savoirs et savoir-faire paysans dans leur fonctionnement, et pour quels effets sur les paysages et l'emploi agricole en région agro-pastorales.

### **I) Recul du pastoralisme et simplification des pratiques de pâturage dans la Montagne limousine : causes et symptômes**

#### **A) Les systèmes agropastoraux des années 1950 : la valorisation d'une large palette d'étages agro-écologiques**

Le paysage de la montagne limousine était, dans les années 50, radicalement différent de l'actuel : la forêt qui occupe aujourd'hui plus de 60%, dont plus de la moitié plantée en résineux, était à l'époque quasiment inexistante (Bonhomme, 2011). La montagne était alors dominée par les landes, qui représentaient jusqu'à plus de 80% des finages villageois (Beynel, 1998). Le reste se partageait entre terres labourables cultivées en céréales et légumes fourragers, en rotation avec des friches herbeuses de longue durée, les *bouiges*, prés de fauche, irrigués grâce à des systèmes de canaux de dérivation des cours d'eau, et pâturages humides correspondant parfois à de véritables tourbières. Toutes les exploitations combinaient à l'époque plusieurs élevages, dont troupeau bovin et troupeau ovin qui, en l'absence à l'époque de clôtures, étaient conduits à la garde par un berger, sortis le matin et rentrés tous les soirs.

Les ovins pâturaient les landes pratiquement toute l'année, associées au printemps au pâturage des *bouiges*, des tourbières en été et du regain sur les prés de fauche à l'automne. La base de l'alimentation des ovins était donc la végétation des landes, y compris en hiver durant lequel l'affouragement restait limité afin d'économiser du foin. Les agnelages étaient calés à la fin de l'hiver (février-mars) afin de faire coïncider la période d'allaitement et de croissance des agneaux avec la pousse printanière de la végétation, ces derniers suivant leur mère au pâturage. Pendant l'été, les agneaux étaient séparés des mères dans la journée : le regain leur était réservé en priorité, alors que les brebis étaient conduites sur des parcours aux ressources fourragères plus fibreuses. Les agneaux étaient vendus à 6 mois sur les foires ou plus rarement à des bouchers en fin d'été, à une trentaine de kg de poids vif.

Les troupeaux bovins étaient conduits à la garde durant les six mois de pâturage, essentiellement dans les *bouiges* au printemps, dans les pacages humides en été et dans le regain des prés de fauche à l'automne. Si les landes étaient le domaine des ovins, celui des bovins était les pâturages humides, d'où ils tiraient la

---

<sup>1</sup> Réalisée dans la cadre d'une thèse de doctorat bénéficiant du soutien financier de la Fondation de France.

majeure partie de leur alimentation au printemps et en été. Un pâturage précoce dans ces zones humides permettait de manger jeunes certaines grandes herbacées comme la molinie et les joncs, moins appétents plus tard dans la saison. La production majoritaire de l'époque étant le veau sous la mère, les vaches étaient donc rentrées tous les soirs pour nourrir le veau. Contrairement aux ovins, les bovins étaient conduits en bâtiment de novembre à mai où ils recevaient du foin et un mélange de céréales et de légumes fourragers. Les vèlages étaient étalés toute l'année afin de permettre à une vache d'allaiter son veau, puis de servir en complément de nourrice pour d'autres veaux.

### **B) Un recul du pâturage facilité par l'accès aux intrants et renforcé par le recours à la moto-mécanisation, piliers de la révolution agricole contemporaine**

L'introduction des intrants et de la moto-mécanisation a complètement modifié la mise en valeur agricole de la Montagne limousine. Les légumes fourragers et les cultures de seigle, avoine et sarrasin ont peu à peu été abandonnés au profit du seul triticale et surtout de prairies temporaires qui, grâce à l'emploi d'amendement et d'engrais de synthèse remplacent les *bouiges*. L'arrivée des premiers tracteurs au début des années 60 a induit l'abandon de la fauche des prés irrigués, dont la pente et le passage des rigoles limitaient fortement l'emploi des machines agricoles. Les prés de fauche irrigués ont été le plus souvent converties en prairies pâturées, mais d'une valeur agronomique amoindrie du fait de l'arrêt de l'irrigation fertilisante. Les landes ont progressivement été défrichées à partir de la fin des années 60, grâce à l'usage du rotavator, plus puissant que la charrue : remplacées par des prairies permanentes sur les espaces les plus plans grâce à l'usage d'amendements calcaires avec un recours important aux engrais de synthèse ; enrésinées ou bien abandonnées là où la pente était trop prononcée.

La diffusion des clôtures fixes (barbelés pour les bovins, ursus pour les ovins) et le recentrage du pâturage sur les végétations les plus denses au plan énergétique, s'est accompagnée de l'arrêt de la conduite à la garde a pris fin.

L'élevage ovin s'est tourné vers la production d'agneaux nés en début d'hiver et engraisés en bergerie pour une vente vers Pâques, nouvelle production permise par l'accès facilité aux aliments complets et par la mise en place de coopératives qui assurent un marché pour les agneaux de bergerie. Les périodes où les animaux ont de forts besoins, c'est à dire la lactation pour les brebis et l'engraissement pour les agneaux, se déroulent désormais en bâtiment et dépendent donc uniquement des fourrages stockés, produits sur l'exploitation (foin et triticale) ou achetés (aliments complets). Le pâturage des brebis d'avril à octobre-novembre est donc une période pendant laquelle les brebis ont des besoins relativement bas.

L'élevage de veaux sous la mère a régressé dans la Montagne limousine à partir du début des années 70, sous les effets conjoints de la concurrence des veaux issus des troupeaux laitiers et de la mise en place de la filière broutard : les jeunes sont aujourd'hui vendus entre 8 et 12 mois et exportés vers des régions où l'engraissement est facilité. Les vèlages sont en général groupés au printemps, afin de les synchroniser avec le pic de croissance de l'herbe sur les prairies. Au-delà d'une certaine taille de troupeau, les vèlages sont étalés de l'automne au printemps. La croissance des broutards au pâturage est en revanche systématiquement soutenue par un aliment concentré disponible à volonté dans des nourrisseurs placés dans les prés. La complémentation des veaux a pour effet de gommer les variations de production laitière entre leurs mères et semble réduire le rôle de la gestion affinée du pâturage dans la croissance des veaux.

### **C) Augmentation de la taille des troupeaux, pratiques de pâturage simplifiées et perte de savoir-faire, notamment dans le pâturage des milieux semi-naturels**

L'augmentation de la productivité physique du travail permise par le recours aux intrants et par la moto-mécanisation, s'est non seulement accompagnée d'une profonde transformation des milieux semi-naturels de la Montagne limousine, mais aussi d'une simplification de la conduite au pâturage des troupeaux, alors que l'élevage ovin n'a eu de cesse de reculer depuis les années 1950, au profit de l'élevage bovin devenu le plus souvent strictement naisseur.

En élevage bovin, les troupeaux sont conduits sur un nombre restreint de parcs de grande dimension, sur

lesquels les lots peuvent rester plusieurs semaines, avec deux à trois passages par an et par parc. Le recoupage de ces grands parcs au fil électrique n'est réalisé que pour le pâturage du regain. De manière à simplifier le travail, ces parcs associent certes plusieurs terroirs, mais très inégalement pâturés : l'accès aux pâturages humides vise à éviter de consacrer du temps pour amener de l'eau au troupeau, la végétation des landes a pour but d'offrir un abri naturel aux animaux, tandis que les anciens prés de fauche et les pâturages humides les plus portants fournissent désormais l'essentiel de la ration. La gestion extensive en grands parcs sur lesquels les troupeaux peuvent passer plusieurs semaines induit des phénomènes de surpâturage sur les espaces où la végétation est la plus appétente et de sous pâturage sinon. Les tourbières, pâturées autrefois à partir du mois de juin ne le sont plus avant le mois de juillet, période à laquelle la molinie a déjà produit des tiges fibreuses peu appétentes. Dans les élevages ovins qui se sont maintenus, les besoins du troupeau étant limités durant la période de pâturage, du fait des nouvelles périodes de mises-bas, les brebis sont conduites en grands parcs clôturés en ursus, rarement recoupés, où elles demeurent durant 2 à 3 semaines (voire davantage), en fonction de la pousse de l'herbe. Cette conduite dans un même parc clôturé durant plusieurs semaines semble d'ailleurs poser des problèmes de parasitisme et s'accompagne d'une augmentation de la fréquence des traitements antiparasitaires.

Enfin, la sélection génétique sur les vaches de race Limousine a entraîné une forte augmentation du gabarit des animaux. Cet alourdissement s'est traduit par un recul du pâturage des tourbières, les animaux refusant de s'aventurer sur ces espaces où ils s'enfoncent trop. Les éleveurs eux-mêmes hésitent à mettre leurs troupeaux dans ce type de milieu où ils pourraient perdre des animaux.

L'évolution des systèmes d'élevage, et la recherche d'un accroissement de la productivité physique du travail ont donc conduit à une très forte réduction du rôle des surfaces pastorales de la Montagne limousine et, par la même, à la perte progressive des savoir-faire relatifs au pâturage de ces espaces. A rebours de ces évolutions, les systèmes agro-pastoraux économes qui émergent depuis une dizaine d'années dans la Montagne limousine visent au contraire à adopter une conduite très fine des animaux au pâturage, tout en réinvestissant les terroirs pastoraux.

## **II) Les systèmes agro-pastoraux économes : forte mobilité et grande technicité dans la conduite au pâturage, au service de la reconquête pastorale**

### **A) Un pâturage tournant incluant la conduite à la garde pour valoriser la complémentarité des étages agro-écologiques et des espèces de ruminants**

#### ***Des végétations semi-naturelles au rôle clé aux périodes d'étiage fourrager***

Malgré le recul, progressif mais massif, des milieux semi-naturels sur la Montagne limousine depuis les années 50, certains persistent ou ont émergé, en complément des prairies permanentes et temporaires : (1) landes à callune résiduelles situées sur les coteaux non-mécanisables, (2) tourbières de fond de vallons envahies par la molinie, une graminée à large feuille très productive, et (3) écosystèmes forestiers. Ces derniers peuvent être de trois types : les sous-bois de résineux et de feuillus riches en canche flexueuse, une graminée à feuille fine offrant de bons reports sur pied, et les friches et coupes forestières, riches en genêts, ronces et petits arbustes comme le sureau noir.

En système économe, les mises bas des brebis sont calées sur les pics de croissance de l'herbe sur les prairies, à savoir avant tout le printemps et secondairement la reprise automnale. Ces dernières sont réservées aux animaux à forts besoins, c'est-à-dire les brebis en lactation et les agneaux à l'engraissement au pâturage. Le troupeau est alors conduit en pâturage tournant, le plus souvent avec des clôtures mobiles de type filets ou *Spider Pac* : les lots d'animaux changent de paddocks tous les 3 à 6 jours (en fonction de la taille du paddock, de la taille du lot et des besoins des animaux), avec un temps de retour sur un même paddock d'un mois minimum au printemps.

Contrairement aux usages prédominants sur la Montagne limousine, les exploitations en système agropastoral économe, qui élèvent principalement (mais pas exclusivement) des brebis, mobilisent cette diversité d'écosystèmes et de végétations pour alimenter le plus largement possible le troupeau ovin au pâturage, et ce tout au long de l'année (photos 1 et 2). L'enjeu est de taille, tout particulièrement aux périodes où la croissance de la végétation ralentit voire cesse : l'été, marqué par des sécheresses récurrentes, et l'hiver, compte tenu du climat montagnard. Le report sur pied joue alors un rôle central : les graminées de zones humides comme la molinie et les arbustes de friches et coupes forestières en été ; les espèces sempervirentes comme la ronce, le genêt ou la callune en hiver. Si l'exploitation n'inclue pas ces végétations semi-naturelles en proportions suffisantes, le troupeau part dès la fin du printemps en estive dans des secteurs plus éloignés de la montagne, constituées de tourbières, landes et sous-bois, où ils sont gardés par un berger.



**Photos 1 et 2 : Pâturage des brebis en système économe : en sous-bois de canche flexueuse en sortie d'hiver (gauche); sur friche forestière avec sureau noir bordé de callune en fleur en fin d'été (droite)**

***Pâturage tournant et renforcement de la mobilité du troupeau grâce à la conduite à la garde***

Sur prairie temporaire comme permanente, un pâturage tournant finement conduit (fort chargement instantané, temps d'occupation et de retour sur chaque parcelle adaptés au rythme de la pousse) permet de tirer le meilleur parti de la pousse de l'herbe sur les prairies, tout en préservant la ressource sur le temps long. Les lots changent de parcs tous les 3 à 5 jours et tournent dans l'année sur 7 à 10 parcs par lot, sans compter les parcelles pâturées pour le regain ; conduite très différente, donc, de celle qui prédomine dans la Montagne limousine aujourd'hui, caractérisée par un rythme très lent de rotation sur les prairies pâturées. Cette rotation plus rapide s'accompagne d'une présence régulière au pré, avec une à deux visites des lots par jour.

Cependant, ces systèmes agro-pastoraux économes de moyenne montagne associent à l'utilisation de ces prairies, où la conduite est proche de celle des systèmes économes de plaine (Voisin, 1957 ; Pochon, 2002 ; Garambois, 2011), celle de végétations beaucoup plus diverses et complexes, ce qui requiert une plus grande mobilité du troupeau et d'autres modalités de conduite. En effet, la situation est plus délicate sur les parcours. D'une part, la pose de clôtures peut s'avérer coûteuse et complexe, notamment dans les zones moins accessibles et plus accidentées. D'autre part, la végétation est très hétérogène, avec le risque, si le pâturage est conduit en grands parcs clôturés, que les animaux parcourent l'ensemble du parc pour ne consommer dans un premier temps que les espèces les plus appétentes, piétinant au passage une partie des ressources, et ne se rabattent sur les ressources plus ligneuses qu'une fois le meilleur consommé, avec à la clé une alimentation appauvrie et d'une perte d'état.

Grâce à une conduite à la garde (photos 3 et 4), les éleveurs, éleveurs-bergers et bergers salariés valorisent l'ensemble des végétations des parcours, tout en veillant à composer un repas équilibré la journée : les ressources fourragères les plus digestibles sont rationnées (herbe fine des sous-bois, gousses de genêts, fleurs de bruyère, feuilles d'arbustes...) et leur consommation alternée avec celle de

végétations abondantes mais plus fibreuses (tourbières à molinie par exemple). L'accès quotidien à de nouveaux espaces et la diversité alimentaire sont utilisés pour stimuler l'appétit des troupeaux (Meuret, 2011). En permettant d'explorer un large périmètre, la conduite à la garde permet également d'aller chercher des ressources supplémentaires éloignées du siège de l'exploitation, élément clé en période d'étiage fourrager.



**Photos 3 et 4 : Eleveur-berger et berger salarié conduisant leur troupeau à la garde, en sous-bois forestier en début de printemps (gauche) et sur tourbière dans le courant de l'été (droite)**

#### ***Combiner plusieurs espèces de ruminants, complémentaires au pâturage***

Une partie des éleveurs de la Montagne limousine en système agro-pastoral économe combine plusieurs espèces de ruminants, aux besoins et aptitudes complémentaires. Le pâturage associant simultanément ovins et caprins permet de faciliter la conduite à la garde du troupeau : les chèvres suivant plus facilement le berger et entraînent dans leur suite les brebis. Les caprins, quant à eux, pâturent davantage les arbustes, et plusieurs éleveurs mentionnent à ce titre une forme de mimétisme de la part des brebis qui, en « copiant » les chèvres, auraient tendance à se nourrir plus largement de ressources arbustives qu'elles négligeraient en pâturent seules.

La combinaison, au pâturage, de plusieurs espèces de ruminants offrent aussi des avantages dans le cas d'une conduite en décalé. Ainsi, plusieurs éleveurs mettent à profit le plus gros gabarit de leurs vaches pour faciliter la réouverture de secteurs de tourbières ou de friches à la végétation particulièrement dense, et où des petits ruminants auraient du mal à se frayer un chemin. La présence d'un petit troupeau équin sur l'exploitation, pâturent derrière des bovins ou des ovins, permet, à moindre coût, de valoriser leurs refus et d'assurer un pâturage à ras utile pour la qualité de la repousse qui suivra.

#### ***Au service du renforcement pastoral, modération des objectifs de rendement, autre sélection génétique et éducation alimentaire des troupeaux***

Afin de favoriser une alimentation reposant le plus largement possible sur le pâturage, les éleveurs ont adapté leurs objectifs de rendement (rythme de croissance, prolificité). La croissance des agneaux élevés au pâturage est moins rapide qu'au sein des exploitations où ceux-ci sont conduits en bergerie et nourris aux fourrages conservés et aux concentrés. Les agneaux engraisés au pâturage sont donc, à âge égal, moins lourds et moins bien conformés que leurs congénères de bergerie, et seront vendus plus âgés pour atteindre le même poids. Ainsi, si des agneaux engraisés en bergerie peuvent être vendus à 17-18 kg de poids carcasse à partir de 4 mois, il faudra au minimum huit mois en Montagne limousine pour atteindre un résultat similaire au pâturage, avec une note d'état et de conformation souvent inférieures. Certains

éleveurs en système économe choisissent donc de produire de l'agneau de report, et de vendre leurs agneaux nés au printemps l'année suivante, à plus d'un an. Les caractéristiques de ces agneaux n'étant pas conformes aux attentes des filières longues, ils sont donc commercialisés via d'autres circuits. De la même manière, les agnelles de renouvellement ne sont pas mises à la reproduction dès leur première année, afin de leur laisser finir leur croissance, et sont rarement saillies avant l'âge d'un an. Enfin, dans l'optique de ne pas compléter les brebis en lactation, l'objectif de prolificité demeure modéré : les besoins des brebis sont moins élevés en allaitant un seul agneau et elles peuvent ainsi les nourrir uniquement sur la base des ressources pâturées.

La majeure partie des éleveurs en système agro-pastoral économe ont choisi des brebis de race Limousine, race originaire de la montagne limousine, plus aptes à valoriser les espaces pastoraux, même si son schéma de sélection n'incluait pas de critères de rusticité. La race n'est toutefois pas le seul levier d'action disponible, puisque deux troupeaux de race similaire ne se comporteront pas de la même manière en fonction de leur conduite (SCOPELA, 2016). L'éducation alimentaire du troupeau est essentielle. Les éleveurs s'efforcent ainsi d'habituer les jeunes animaux à manger très tôt des ressources grossières, afin de favoriser le développement de leur panse et, une fois adultes, de valoriser au mieux les fourrages plus ligneux et plus encombrants : sortie précoce des agneaux (voire agnelages en extérieur) et sevrage retardé afin qu'ils demeurent longtemps au contact de leur mère, auprès de laquelle ils s'initient précocement, pas mimétisme, au pâturage.

## **B) Une gestion intégrée de la santé animale visant à limiter les risques du parasitisme**

Le mode de conduite au pâturage des troupeaux est le levier principal de gestion du parasitisme, élément particulièrement important pour les petits ruminants, plus sensibles. Toutes les composantes de la conduite du troupeau au pâturage concourent à limiter les risques : pâturage tournant respectant un temps de retour suffisamment long, éviter le surpâturage et déchargement des prairies grâce aux départs en estive, usage accru des parcours où les brebis consomment la partie haute des végétaux moins infestée, suivi sanitaire plus précis du troupeau grâce à la garde, sevrage tardif afin de limiter le stress des jeunes (souvent source d'infestations massives), etc. Sur les parcelles où des fourrages peuvent être récoltés, l'alternance fauche-pâturage contribue également à retarder le retour des animaux au pâturage, tandis que le pâturage à ras des refus des ovins par les équins soumet plus intensément les larves et œufs des parasites au gel et au rayonnement solaire, et favorise leur destruction (Cornille, 2010).

La diversité des plantes pâturées permet aux animaux de consommer de très nombreux antioxydants et autres molécules susceptibles de limiter le parasitisme. Les bruyères contiennent par exemple de l'acide ursolique, antibactérien, anti-inflammatoire et anti-tumoral (Rolland, 2007), et les feuilles de hêtres, de chênes, de ronces ou bien les aiguilles de sapins, grâce à leurs propriétés vermifuges reconnues (Gallard, 2004 ; Hoste, 2003), ont un effet inhibiteur sur le développement des parasites. De même, les tourbières sont des milieux très acides et froids, conditions qui empêchent l'implantation de la limnée, escargot aquatique hôte de la grande douve, qui est le principal parasite en zone humide (Rolland, 2007).

Enfin, les éleveurs pratiquent le moins possible le traitement antiparasitaire systématique des brebis, afin d'éviter la sélection de parasites résistants et, lorsqu'il s'avère néanmoins nécessaire, s'attachent à varier les molécules et utilisent de préférence des produits à faible rémanence. Les traitements sont donc faits si possible au cas par cas, favorisant le repérage des sujets plus sensibles et leur réforme anticipée.

Les éleveurs cherchent également à développer l'immunité des jeunes animaux en cherchant à les exposer relativement tôt au parasitisme, mais tout en évitant une primo-infestation massive : la mise au pâturage est ainsi précoce, mais en priorité sur des surfaces à faible risque d'infestation. Le renforcement du système immunitaire peut également reposer sur la minéralisation des troupeaux, notamment en oligoéléments, pour certains déterminants pour le bon fonctionnement du système immunitaire (Drogoul C. et Germain H., 1999).

Avec pour objectif une alimentation reposant le plus largement possible sur le pâturage, y compris de végétation semi-naturelles, l'étude du fonctionnement de ces systèmes agro-pastoraux économes révèle une très grande finesse, tant dans la conduite du troupeau que dans la gestion des milieux, et une profonde technicité, qui invite à s'interroger sur leur élaboration et les savoirs et savoir-faire mobilisés par les éleveurs et bergers qui les mettent en œuvre, à rebours complet du modèle de développement agricole prédominant dans la Montagne limousine.

### **III) Les systèmes agro-pastoraux économes : une nouvelle combinaison de savoirs et savoir-faire**

#### **A) Un fonctionnement plus pastoral, proche en ce sens de celui des systèmes de production des années 1950**

Les systèmes agro-pastoraux économes présentent des ressemblances manifestes avec les systèmes de production pratiqués dans les années 1950 dans la Montagne limousine, à une époque où le pastoralisme était beaucoup plus central dans l'alimentation des troupeaux, notamment quant à l'utilisation complémentaire de l'ensemble des différents types de végétation disponibles et au calage des besoins des animaux à la saisonnalité de la croissance végétative, en jouant notamment sur les période de mise-bas. En élevage ovin, les agnelages sont ainsi à nouveau calés au printemps, de manière à élever au maximum les animaux à l'herbe, et non sur la base de fourrages stockés et de concentrés. Ces similitudes se retrouvent également dans le jeu sur la complémentarité entre espèces : dans les années 1950, il était par exemple fréquent de trouver quelques chèvres mélangées avec les troupeaux de brebis, afin de faciliter leur conduite, de nourrir les agneaux orphelins ou abandonnés par leur mère, et comme témoin sanitaire de l'état du troupeau, les caprins étant plus sensibles au parasitisme que les ovins.

#### **B) ... mais adapté au contexte actuel et mobilisant certains acquis scientifiques des dernières décennies**

Néanmoins, à bien des égards, les systèmes agro-pastoraux économes dépassent la seule reproduction de ces systèmes des années 1950, réadaptés et enrichis de nouveaux savoirs. Les écosystèmes aujourd'hui pâturés par les troupeaux ovins sont en effet nettement différents de ceux qui prévalaient il y a 70 ans. Les landes, qui représentent aujourd'hui moins de 1% de la surface de la Montagne limousine ne peuvent donc plus jouer le rôle de pilier de l'alimentation des troupeaux ovins qu'elles constituaient autrefois, notamment en hiver. De même, les anciens prés irrigués qui servaient à engraisser les agneaux pendant l'été n'existent plus en tant que tels. A l'inverse, les éleveurs doivent composer avec trois nouveaux type de milieux : les prairies créées sur les landes défrichées, les friches forestières issues du reboisement spontané de coupes à blanc, et les accrus forestiers issus de l'abandon d'anciennes landes et pâturages. Enfin, après 70 ans de déprise, les tourbières ont une physionomie différente de celle des années 50, marquée par un surdéveloppement de la molinie.

Les chaînes de pâturage sont donc construites selon une logique analogue, mais adaptée au visage actuel des étages agroécologiques de la montagne. Les récents travaux réalisés sur la dynamique des landes et des tourbières (Bonhomme, 2011), sur les cycles des parasites (Lumaret, 2010) ou bien la stimulation alimentaire des troupeaux (Meuret, 2010) constituent dès lors autant d'outils pour affiner les pratiques de pâturage.

Les troupeaux sont également bien plus mobiles que par le passé : s'ils restaient à proximité des exploitations agricoles dans les années 50, car devant rentrer tous les midis et soirs, ils peuvent aujourd'hui partir en transhumance pendant plusieurs mois jusqu'à 10 à 20 km des exploitations. Cette pratique constitue d'ailleurs aujourd'hui la clé de l'autonomie fourragère, car beaucoup d'éleveurs ne disposent pas d'accès aux tourbières pour pâturer l'été. Si les éleveurs devaient autrefois composer avec les seules ressources disponibles à proximité des exploitations, la transhumance permet aujourd'hui de compenser les déficits fourragers aux périodes d'étiage.

Enfin, les animaux aujourd'hui commercialisés par les éleveurs sont bien différents de ceux des années 1950. Autrefois vendus en maigre sur les foires, les agneaux sont aujourd'hui souvent vendus engraisés à l'herbe et les brebis abattues grasses pour être transformées à la ferme. Aujourd'hui, les éleveurs, qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) vendre leurs animaux en coopérative, s'attachent donc à trouver de nouveaux débouchés, souvent par la vente directe, mais aussi grâce à des magasins de revendeurs ou de producteurs.

### **C) Aux origines des systèmes agro-pastoraux économes : adapter les acquis de la conduite économe en pâturage tournant de plaine, renforcée des savoir-faire des bergers**

Ces nouveaux systèmes agro-pastoraux de la Montagne limousine tirent leur origine du croisement de plusieurs acteurs du développement agricole et de la préservation des écosystèmes. Le travail de reconquête pastorale en Montagne limousine a en effet été initié, au début des années 2000, grâce à l'action conjointe du Parc Naturel Régional (PNR) Millevaches, du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) du Limousin et de l'Union Nationale de Sélection et de Promotion (UPRA) de la Race Limousine. En effet, une large part du PNR ayant été classée en zone Natura 2000, il existait un important enjeu de préservation des landes résiduelles et des tourbières de la Montagne limousine. Le travail avec des éleveurs locaux s'est avéré la solution la plus efficace, d'autant plus que ces derniers pouvaient contractualiser des Mesures Agri Environnementales sur ces espaces. Néanmoins, cette collaboration n'était envisageable que sous la forme d'une mise à disposition de parcs clôturés en fixe, impossible à mener sur l'ensemble de la Montagne limousine, *a fortiori* au regard du grand nombre de parcelles appartenant à des propriétaires différents.

En 2007, un premier berger salarié est donc engagé, chargé de la garde d'un troupeau sur la plus grande tourbière de la Montagne, dont de vastes secteurs n'étaient plus pâturés depuis des décennies. Suite à cette expérience, plusieurs zones d'estives ont été progressivement constituées pour des éleveurs ovins en manque de surface, mobilisant chacune un berger salarié. Plusieurs d'entre eux, ainsi que certains employés du PNR puis du CEN, ont fini par s'installer sur la Montagne limousine, souvent hors cadre familial. Ces éleveurs récemment installés disposent ainsi d'expériences et de références techniques qui expliquent des pratiques adaptées de leurs savoir-faire préalables de bergers de haute montagne, et qui tranchent radicalement avec celles prédominantes localement.

Certains éleveurs en système agro-pastoral économe ont néanmoins initié la construction de leur système selon une autre voie. Adhérents à la Fédération des Centres d'Initiatives et de Valorisation Agricole et du Milieu Rural (CIVAM) en Limousin, une association de développement agricole engagée dans l'éducation populaire et la mise en place de systèmes de production agricole plus économes et autonomes, leur recherche d'économie et d'autonomie grâce au recours accru au pâturage mobilisait initialement avant tout les acquis de groupes d'agriculteurs en système herbager économe de plaine et piémonts arrosés. Bien que précieux, ceux-ci se sont rapidement révélés insuffisants pour valoriser les végétations semi-naturelles, . D'autres savoirs et savoir-faire empiriques ont ainsi dû être progressivement mobilisés, mobilisant parfois des résultats de la recherche scientifique acquis et avec le concours de conseillers techniques spécialisés dans le pastoralisme, comme SCOPELA, organisme de conseil et de formation reconnu pour son expertise sur le pâturage des végétations semi-naturelles. Les échanges avec les éleveurs en système herbager des piémonts demeurent néanmoins féconds : des journées d'échanges au sein du CIVAM, centrées sur l'engraissement des bovins à l'herbe en zone de piémont, ont ainsi contribué à faire émerger l'idée d'élever de l'agneau de report, dans une semblable logique d'allongement du cycle de production.

Les éleveurs issus de ces deux dynamiques se sont finalement fédérés au sein d'un même groupe, l'Association pour le Pastoralisme sur la Montagne Limousine, créée en 2019 et adhérente en tant que groupe CIVAM à part entière depuis octobre 2020.

Le croisement de ces multiples références leur a progressivement permis de construire des systèmes agro-pastoraux économes faisant la fusion entre les savoir et savoir-faire paysans et scientifiques des groupes herbagers et ceux des bergers et spécialistes, déclinaison adaptée aux régions agro-pastorales de



la démarche de paysan-chercheur initiée par André Pochon (2008) dans l'Ouest français. Qu'en est-il, dès lors, des effets économiques et sociaux de cette combinaison originale au service de la reconquête pastorale ?

#### IV) Systèmes agro-pastoraux économes et savoir-faire paysans au service d'une plus grande durabilité de l'agriculture sur la Montagne limousine

##### A) Des besoins réduits en stocks fourragers et en équipement

En système agro-pastoral économe, la maximisation du pâturage (figure 1) permet aux éleveurs de limiter leurs besoins en foin et en aliments concentrés, et consacrer une plus large part de leurs prairies à l'engraissement des animaux au pâturage, plutôt qu'à la fauche. Les prairies ne reçoivent jamais de fertilisants de synthèse. Les cultures de céréales sont généralement absentes, les rares besoins pouvant être couverts par les achats.




Figure 1 : Calendriers fourragers comparés sur la Montagne limousine en élevage ovin viande : système économe avec agnelage en avril (gauche) ; conduite alimentaire prédominante avec agnelage en novembre (droite)

Les faibles surfaces en cultures et fauche impliquent un faible investissement dans le matériel agricole. Les principales tâches moto-mécanisées peuvent être sous traitées à des entreprises de travaux agricoles (ETA), ou bien réalisées en Cuma, où l'ensemble du matériel de fenaison est alors mutualisé. Les investissements limités dans la mécanisation permettent de limiter les charges qui y sont liées : moins de frais d'assurances, de carburant et d'entretien du matériel.

##### B) La commercialisation en vente directe, rendue nécessaire par des produits en dehors des standards des filières longues

En élevage ovin, les filières longues fixent comme objectif de production des animaux le plus jeune possible, vendus à deux périodes privilégiées : Noël et Pâques. Les agneaux engraisés au pâturage produits en système économe sont donc en dehors de ces standards et fortement pénalisés. Lorsque les éleveurs engraisent la majeure partie de leurs agneaux à l'herbe, ils ont ainsi tendance à se tourner vers les circuits courts pour les commercialiser, en vente directe aux consommateurs, ou bien auprès de magasins de producteurs, revendeurs ou bouchers locaux. Les agneaux sont alors vendus au détail et la conformation et l'état d'engraissement ne sont pas sanctionnés. En s'inscrivant dans d'autres circuits de commercialisation, les éleveurs ont également tendance à transformer de plus en plus de produits : les agneaux de « queue de lots », susceptibles de ne pas passer l'hiver, plutôt que d'être vendus en maigre à des tarifs dérisoires, peuvent par exemple être transformés en conserve, les brebis de réforme en merguez, et la laine en feutre.


##### C) Des systèmes agro-pastoraux économes plus créateurs de richesse et d'emploi agricole, malgré un accès limité aux terrains agricoles à plus haut potentiel de rendement

Les entretiens technico-économiques réalisés au sein de la Montagne limousine (une soixantaine au total), conduits au sein de l'ensemble des exploitations (économiques, comme inscrites dans le développement agricole prédominant), ont permis de modéliser le fonctionnement et les résultats économiques des différents systèmes de production présents aujourd'hui dans la Montagne limousine, dont les principaux sont brièvement présentés au tableau 1.

	SP1 Ovin économe	SP2 Ovin	SP3 Ovin + Bovin	SP4 Bovin naisseur (brouards)	SP5 Bovin sélectionneur	SP6 Bovin veaux de lait
SAU + Estive (ha)	110 + 50	90 + 0	170 + 0	400 + 0	220 + 0	140
Surface de fauche (en % des surfaces utilisées)	25%	22%	40%	50%	41%	43%
Nb actifs	2	1	1	2	2	2
Nb brebis	300-350	300- 350	50-150	/	/	/
Nb vaches	/	/	60-90	225-275	80-130	60-100
Mode de commercialisation	Vente directe et boucheries	Coopérative ou groupement de producteurs				

**Tableau 1 : Caractéristiques des principaux systèmes de production (ovin et/ou bovin) et d'un système ovin économe de la Montagne limousine**

La valeur ajoutée nette (VAN) par actif, qui mesure la richesse agricole créée par actif est largement supérieure en système économe par rapport aux autres systèmes, alors même que son produit brut (PB), qui mesure quant à lui la valeur de la production, est l'un des plus bas des six systèmes (et ce malgré la commercialisation en circuits courts et le recours à la transformation à la ferme pour mieux valoriser une partie des animaux) (figure 2). C'est donc bien avant tout par la compression des consommations intermédiaires et de capital fixe que les éleveurs parviennent à créer davantage de richesse. Ainsi, les achats d'aliments qui ne représentent que 7% du PB en système économe, atteignent 50% pour le système ovin non économe (SP2) et de 20% à 30% pour les autres systèmes de production associant élevages ovin et bovin ou spécialisés en élevage bovin (SP3, SP4, SP5 et SP6). Les dépréciations annuelles de capital fixe (DK bâtiments + DK matériel) correspondant aux frais moyens annuels dans les bâtiments et équipements, qui représentent seulement 4% du PB en système économe, dépassent 15% du PB pour les cinq autres systèmes.



**Figure 2 : Comparaison de la valeur ajoutée dégagée par actif (en euros/actif) des principaux systèmes de production (ovin et/ou bovin) et d'un système ovin économe de la Montagne limousine**

A rebours des autres systèmes de production de la Montagne limousine, l'élaboration de ces systèmes agro-pastoraux économes vise donc à privilégier la productivité *économique*, et non pas la productivité physique. Le système bovin naisseur (avec vente des mâles en broutards) (SP4), type d'élevage qui prédomine aujourd'hui dans la Montagne limousine, qui présente à ce jour le plus haut niveau de productivité physique du travail de la région avec 125 vaches par actif, présente ainsi un produit brut par actif quatre fois supérieur à celui du système ovin économe, mais au prix de coûts de production très élevés : ceux-ci absorbent ainsi 92% de son produit brut, contre 60% en système ovin économe. Le poids des subventions dans le revenu agricole est ainsi sensiblement plus réduit en système économe, alors que ces dernières constituent l'essentiel des revenus enregistrés au sein des autres systèmes de production de la Montagne limousine.

## Conclusion

L'étude des dynamiques agraires en Montagne limousine et du développement récent en son sein de systèmes agro-pastoraux économes inscrits dans un processus de reconquête pastorale, témoigne d'une élaboration et combinaison intense de savoirs et savoir-faire paysans, qui a permis d'aboutir aujourd'hui à des systèmes de production originaux, source d'un développement agricole plus durable et plus autonome. Ces travaux confirment ainsi les premiers résultats enregistrés dans d'autres régions agro-pastorales françaises, notamment en zone de piémont méditerranéen (Morsel, 2018 ; Garambois et al., 2020).

Moins gourmands en capital immobilisé et ainsi plus facilement accessibles à des candidats à l'installation, ces systèmes agro-pastoraux économes ne sont cependant aujourd'hui mis en place que par une minorité d'éleveurs de la Montagne limousine, ce qui pose la question de la diffusion de ces pratiques. Ces systèmes économes supposent en effet non seulement l'acquisition d'une technicité plus grande encore que celle de leurs homologues du Grand Ouest, mais aussi d'une grande capacité d'adaptation, à partir du référentiel des pratiques progressivement bâti en groupe, compte tenu de la forte diversité des végétations disponibles et de leurs proportions très variables d'une exploitation à une autre. L'enjeu des échanges entre pairs n'en est donc ici que plus grand, pour lesquels l'existence de groupes locaux fédérant éleveurs et bergers apparaît particulièrement déterminante.

## BIBLIOGRAPHIE

**Beynel C., 1998.** Forêt et société de la montagne limousine. Presses Universitaires de Limoges.

**Bonhomme M., 2011.** Guide de gestion des landes. Retour d'expérience en Limousin. Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin, Saint Gence (France), 124p.

**Cornille Y., 2010.** « La gestion du risque parasitaire et l'usage de traitements naturopathiques face aux enjeux de santé animale et de maîtrise d'impact sur l'entomofaune ». In : J.-P. Lumaret (dir.), 2010. Pastum hors-série, Association Française de Pastoralisme et Cardère éditeur : p 91-111.

**Demangeon A. 1911.** La montagne dans le Limousin. In: *Annales de Géographie*, t. 20, n°112, 1911. pp. 316-337

**Devienne S., Garambois N., Dieulot R., Lebahers G., 2007.** Les systèmes de production économes et autonomes pour répondre aux enjeux agricoles d'aujourd'hui. Paris : Ministère de la transition écologique, 2017 - 41 p., bibliogr., graph.

**Drogoul C., Germain H., 1999.** Santé animale. Bovins, ovins, caprins. Educagri éditions.

**Gaillard L., 2004.** Impact de la distribution de plantes riches en tannins condensés sur les strongyloses digestives et différents paramètres zootechniques chez les caprins. Thèse vétérinaire Lyon I.

**Garambois N., 2011.** Des prairies et des hommes - Les systèmes herbagers économes du Bocage poitevin : agro-écologie, création de richesse et emploi en élevage bovin, Thèse de doctorat, AgroParisTech, Paris, 462 p. + annexes.

**Garambois N., Jallot L., Morsel N., 2020.** « Les systèmes agropastoraux économes. Vers un développement agricole plus durable en moyenne montagne et piémont ». In : Aubron C., Garambois N. et Nozières Petit M.-O. (dir.) L'économie des régions agro-pastorales revisitée. Pastum hors-série, Association Française de Pastoralisme et Cardère éditeur : 43-68.

**Hoste H., 2003.** « Rôle des fourrages riches en tannins dans la maîtrise du parasitisme par les strongles du tube digestif ». In : Alter Agri 61 : p 17-19.

**Hubert B., Deverre C., Meuret M., 2011.** « Deux siècles de changement radical pour les parcours du Sud de la France ». In : Un savoir faire des bergers, 2011, Meuret M. (dir.), Ed. Quae : p 25-42.

**Lacroux C., 2006.** Régulation des populations de nématodes gastro-intestinaux dans deux races ovins INRA 401 et Barbados Black Berry. Thèse Institut National Polytechnique Toulouse.

**Lumaret J.-P. (dir.), 2010.** Pastoralisme et Entomofaune. Pastum hors-série, Association Française de Pastoralisme et Cardère éditeur, 128p.**Meuret M., 2011.** « Modèle MENU : le berger vu comme un chef cuisinier ». In : Un savoir faire des bergers, 2011, Meuret M. (dir.), Ed. Quae : p 147-166.

**Meuret M. (dir.), 2011.** Un savoir faire des bergers. Editions Quae, 340p.

**Morsel N., 2018.** Analyse-diagnostic du système agraire des hautes vallées de l'Orb et du Lodévois et de leurs piémonts, Mémoire d'ingénieur, AgroParisTech.

**Pochon A., 2002.** La prairie temporaire à base de trèfle blanc, 3ème édition mise à jour, Cedapa, Plérin, 127 p.

**Pochon A., 2008.** Agronomes et paysans, un dialogue fructueux, Editions Quae, 72 p.

**Rieutort, L., 1995.** L'élevage ovin en France. Pu Blaise Pascal - Collection : CERAMAC.

**Rolland L., 2007.** Système Mixte naisseur Limousin du Plateau des Millevaches & Système Brebis Limousines. Fiche technique réalisée dans le cadre d'un stage de fin d'étude au PNR Millevaches.

**Scherer J.-P., 2019.** Intervention dans le cadre d'une demi journée d'échange sur la flore bioindicatrice pour la Fédération des CIVAM en Limousin.

**SCOPELA, 2016.** Bagages génétiques et apprentissages. Fiche technique.

**Tosi M.F., 2005.** « Innate immune responses to infestation ». In : J. Allergy Clinical Immunology 116 : p 42-48.

**Voisin A., 1957.** La productivité de l'herbe. Ed. France Agricole.