

# Préserver la biodiversité en agriculture

**L'**environnement est un des problèmes cruciaux de notre société. Depuis la Conférence de Rio («Sommet de la terre» de 1992), une prise de conscience générale est réelle, et les menaces qui pèsent sur la diversité du monde vivant sont officiellement reconnues. Les politiques ont mis en place quelques actions pour préserver le patrimoine naturel. Ainsi, en Europe, les Directives «Oiseaux» et «Habitat», les Parcs naturels, les arrêtés de biotope, et la mise en place du réseau Natura 2000 posent les jalons d'une législation plus attentive aux problèmes de la biodiversité. Il faut aller plus loin.



Dossier réalisé par Emmanuel Louzier et Joseph Soulard  
(FRCIVAM Pays de la Loire)

**S**ur le terrain les agriculteurs sont les premiers gestionnaires de la nature. Leur implication dans la protection de l'environnement est donc indispensable. Pourtant, l'intérêt économique d'une exploitation est souvent jugé antinomique de son intérêt écologique. Même si certains agriculteurs, bios ou durables, tentent de concilier ces deux aspects, la prise en compte de l'environnement passe souvent par les subventions Ogif ou mesures agri-environnementales. Ce dossier a pour objectif de démontrer l'intérêt de la biodiversité et d'en cerner les enjeux (p. II). Des chercheurs de l'INRA et du CNRS nous expliquent comment la

science évalue l'incidence écologique des pratiques agricoles (p. III et VI). Différents témoignages d'acteurs de terrain œuvrant pour la préservation de la biodiversité en agriculture illustrent l'implication citoyenne et l'intérêt des pratiques de l'agriculture durable (p. V). Le problème des races menacées est illustré par le cas de la vache Bretonne Pie Noire (p. VII). La préservation de la biodiversité dispose maintenant d'outils de diagnostic permettant de déboucher sur un «plan de gestion détaillé» de l'environnement (p. VIII). Il reste peut-être à mettre en place des outils incitatifs efficaces permettant de généraliser les heureuses initiatives de terrain. ■

# L'intérêt de la biodiversité

La «biodiversité», ou tout simplement la diversité biologique, existe à tous les niveaux d'organisation du monde vivant depuis les molécules jusqu'à la biosphère. Le lancement médiatique récent de l'expression correspond toutefois plus spécialement au niveau supérieur constitué des espèces, des écosystèmes et des paysages, dont la disparition et la dégradation s'accroissent de façon évidente sous nos yeux.

La plus apparente des manifestations de la biodiversité est celle des paysages. Liée aux conditions du milieu, notamment au climat et au relief, elle est aussi considérablement accrue par l'isolement géographique des territoires. Or cette nature primitive ne peut nourrir que des populations humaines de faible densité et vivant dans des conditions peu compatibles avec les désirs actuels du genre humain. Conséquence inéluctable de l'accroissement des populations de notre espèce, des écosystèmes nouveaux ont donc presque partout remplacé ceux qui existaient au cours des millénaires précédents. La cueillette de nombreux végétaux y est remplacée par la culture de quelques rares espèces et l'élevage de quelques animaux domestiques s'est substitué à la consommation de multiples espèces sauvages.

S'il n'est plus possible évidemment, ni même souhaitable, de reconstituer la diversité originelle des écosystèmes, on peut au moins en protéger quelques éléments. C'est la tâche des réserves naturelles mais celles-ci, situées dans des régions souvent peu accessibles et inhospitalières, ne donnent pas une image fidèle du visage originel de la planète. Il n'en est que plus souhaitable, dans la mesure où il en est encore temps, d'assurer la protection des milieux, autrefois les plus répandus, dont la fertilité ou l'attrait touristique a entraîné une modification profonde.

Parallèlement aux destructions, les hommes ont toutefois créé aussi par leurs cultures, leurs élevages et leurs diverses activités un grand nombre d'écosystèmes nouveaux. Cet accroissement de diversité reste toutefois limité, tant par un excès d'anthropisation que par l'uniformisation qu'entraî-

nent de continuels échanges de flore et de faune.

## Homogénéisation

Avec l'augmentation de la densité et des besoins des populations humaines, cette homogénéisation de notre planète ne fait que s'accroître. Certains pourraient considérer comme favorable une telle transformation des écosystèmes au profit apparent de l'homme. Ce point de vue néglige toutefois des aspects fondamentaux du problème, car la vie de l'homme n'a pas pour but unique la satisfaction de ses besoins alimentaires et énergétiques immédiats. La qualité de vie implique aussi un cadre dont l'agrément est indissociable de la diversité des milieux : le développement des voyages est bien la preuve de ce besoin. La diversité du monde vivant est aussi une richesse scientifique dont l'homme moderne ne saurait se priver sans une certaine déchéance intellectuelle. Non

moins fondamentale enfin est la considération de l'avenir de la biosphère, car l'évolution des êtres vivants n'est possible qu'à la faveur de la biodiversité et toute diminution de celle-ci affecte donc la possibilité d'adaptation du monde vivant à des changements de milieu.

De ce pouvoir d'adaptation la richesse spécifique et la variété des paysages sont des éléments fondamentaux, mais elles doivent être complétées par le maintien d'une diversité génétique intraspécifique. Celle-ci s'accroît avec l'aire géographique occupée et elle se réduit au contraire lorsque les effectifs diminuent. Or la plupart des espèces sauvages ont de nos jours des effectifs de plus en plus faibles, d'où une diminution de leur diversité qui risque de descendre à un niveau incompatible, non seulement avec un pouvoir d'adaptation à de nouvelles conditions, mais même avec le maintien d'une vitalité intrinsèque suffisante. Cette diminution de la diversité

génétique pose aussi des problèmes graves dans le cas des espèces domestiques, tant animales que végétales.

Des élevages locaux souvent plus ou moins isolés avaient conduit à la formation d'un grand nombre de races domestiques, aussi bien chez les chiens et les poules que chez les chevaux, les bovins et les moutons. Avec la confrontation des performances de ces races que permettent les échanges interrégionaux et internationaux, certaines ont paru n'avoir pas d'intérêt et ont parfois même disparu. Ces disparitions constituent une menace pour l'avenir en rendant plus aléatoire une adaptation à de nouvelles conditions du milieu (page VI).

Les progrès du génie génétique ont par ailleurs attiré l'attention sur une technique nouvelle d'accroissement de diversité du patrimoine héréditaire d'une espèce domestique : c'est l'introduction d'un gène provenant d'une espèce différente, le plus souvent une espèce sauvage voisine. Le maintien d'une diversité suffisante au sein d'une espèce domestique n'implique donc pas seulement la persistance de ces diverses races, mais il dépend aussi de la sauvegarde d'autres espèces provenant d'écosystèmes naturels.

Sans doute est-ce donc dans la protection des paysages que doit être dirigé le maximum d'efforts. ■

**Maxime LAMOTTE**

(Muséum national d'histoire naturelle, Paris)

## Principe d'éradication et biodiversité

Depuis 1974, un arrêté ministériel rend obligatoire, région après région, le traitement systématique de tous les bovins en vue de l'éradication d'une espèce animale : le varron (*TRI 83*). Les risques encourus par l'éradication d'une espèce, comme ceux liés aux manipulations génétiques, sont imprévisibles, aussi serait-il urgent d'adopter un principe de précaution. Persuadé que cette façon d'appréhender un problème de parasitisme représente une mauvaise approche, en 1997, les «refuseurs» se regroupent au sein d'une association «Coordination nationale contre l'éradication du varron, pour une agriculture responsable»\*. Les opposants rejettent le principe même d'éradication car il est essentiel de préserver la diversité des espèces vivantes dans un souci de recherche et de respect des équilibres, seuls garants d'harmonie et de santé. Nous savons en effet qu'en éradiquant délibérément une espèce vivante, nous prenons le risque de faire exister des êtres nouveaux dont nous ignorons tout et contre lesquels on «déclarera la guerre» avec encore plus de moyens. Nous choisissons une voie qui nous paraît plus porteuse d'avenir : apprendre à travailler en bonne intelligence avec le vivant en favori-

sant l'immunité naturelle par le biais du respect des équilibres.

Sur le plan médical, chaque fois qu'un barrage empêche une maladie d'exprimer le déséquilibre du patient, une affection plus forte viendra pousser ou contourner la fortification...

Concrètement, la démarche que propose les opposants consiste à aborder le problème de la manière suivante :

- est-ce que la pression parasitaire (varron dans le cas présent) représente un réel danger pour la santé animale ou humaine ? Cette pression devient-elle incontrôlable ?

- si le parasite prend effectivement une ampleur inacceptable, quelles en sont les raisons ? (conditions d'élevage, alimentation etc...)

- quels moyens avons-nous pour agir sur ces causes ?

Ce n'est qu'après avoir fait cette démarche globale, que l'on pourra éventuellement et ponctuellement diminuer la pression parasitaire de manière arbitraire, tout en travaillant simultanément à la mise en place d'un meilleur équilibre... ■

\*École d'agrobiologie de Beaujeu (69)

# Aménager la biodiversité des auxiliaires des cultures

**Le champ cultivé est un écosystème ouvert, soumis notamment à l'influence de son environnement végétal. Ce dernier conditionne à la fois les risques d'infestation par les ravageurs et la colonisation par des auxiliaires de cultures. La monoculture et les interventions de l'homme rendent l'agrosystème fragile et limitent la biodiversité de sa faune utile. La gestion des ravageurs et des auxiliaires ne peut donc se faire sans considérer l'influence de l'environnement.**

L'aménagement de l'environnement est déjà abondamment pratiqué en arboriculture fruitière avec la plantation de formations végétales composites (haies, bandes boisées, bosquets) destinées à augmenter la biodiversité des auxiliaires. Bien que délicate à mettre en œuvre, cette pratique est très répandue, mais elle est restée empirique. En effet, aucun critère n'existe actuellement pour déterminer si un végétal est un bon réservoir d'auxiliaires.

La diversité végétale est directement liée à la diversité animale. De plus, un végétal a une faune globale d'autant plus diversifiée qu'il a une vaste aire de distribution, qu'il appartient à un groupe botanique abondamment représenté dans la région considérée, ou qu'il participe aux formations végétales dominantes (d'où la pauvreté des espèces exotiques pourtant parfois communes dans les haies). *A priori*, ces principes de richesse faunistique valent malheureusement aussi bien pour les ravageurs que pour les auxiliaires.

Nos travaux effectués au sein de l'Unité de Zoologie de l'Inra d'Avignon visent principalement à déterminer l'intérêt d'un végétal comme réservoir d'auxiliaires pour une culture donnée. Notre enjeu est donc de dégager les principes d'une manipulation optimale de l'environnement

végétal afin d'augmenter sélectivement la diversité de la faune utile à la culture, tout en gardant minimale la diversité des nuisibles. Dans ce but, nous avons étudié le peuplement des arthropodes (embranchement d'invertébrés qui comprend les insectes, acariens, araignées, myriapodes et crustacés) sur 44 espèces de ligneux, toutes situées en lisière de cultures.

## Résultats fondamentaux

Une série de données acquises sur le peuplement des arthropodes des espèces suivantes : poirier, aubépine, frêne, lierre et peuplier, met en évidence que les arthropodes sont nettement spécifiques à leur plante-hôte. Par contre, les calculs montrent que la fraction phytophage est plus spécifique de la plante-hôte que la fraction auxiliaire. Il apparaît donc que ce sont les végétaux botaniquement les plus éloignés qui partagent entre eux le moindre nombre de phytophages en commun.

Si nous examinons la composition de la communauté des 44 espèces inventoriées, celles-ci sont réparties en trois niveaux alimentaires : 1- le végétal, 2- les phytophages (qui se nourrissent de la plante), 3- les entomophages (qui se nourrissent des phytophages : ce sont les auxiliaires).

Une première approche permet de constater que, si l'effectif de phytophages est supérieur à celui des auxiliaires, le nombre d'espèces est en revanche toujours nettement inférieur. Ce résultat montre que l'installation d'une essence donnée se solde essentiellement par l'apport d'une biodiversité dominante d'auxiliaires par rapport à celle des phytophages. Toutefois, en tenant compte des principes de spécificité énoncés précédemment, il est à prévoir que la dominance des auxiliaires pour une espèce végétale unitaire cesse d'exister pour un assortiment trop élevé d'essences. Enfin, ces principes ne nous renseignent pas sur les interactions de la faune entre essences.

Notre étude permet de mettre en évidence une corrélation entre certains des cinq végétaux étudiés (lierre, poirier, aubépine, peuplier et frêne), mais pas avec d'autres. Le poirier par exemple est corrélé avec le frêne. Ces végétaux hébergent tous deux des psylles, des pucerons et des cécidomyies spécifiques.

Ces résultats montrent que toutes les essences n'ont pas, vis à vis du poirier, le même intérêt pour le peuplement des principaux auxiliaires. Il existe des végétaux à forte ou à faible corrélation entre eux pour la faune «utile». Cette corrélation implique surtout la spécificité du peuplement des essences entre

lesquelles elle est mesurée. Nous disposons donc d'un moyen de repérer les végétaux présentant un intérêt pour une espèce cultivée donnée.

## Recherches appliquées

L'intérêt de l'étude est maintenant de raisonner le choix des essences pour constituer un milieu minimal cohérent le plus apte à favoriser les auxiliaires au bénéfice du verger. Pour cela, il faut tenir compte des relations plante-insecte, insecte-insecte et verger-environnement : c'est la mise au point d'une formation dite «fonctionnelle». Cette formation pourra être une haie simple ou double, une bande boisée, ou un bosquet. Il convient de tester sur le terrain l'efficacité réelle de l'assemblage végétal : on entre dans une phase d'expérimentation.

La prise en compte de ces divers résultats montre qu'il n'est pas utopique d'escompter manipuler spécifiquement le cortège des auxiliaires : ce sont eux qui, au niveau de l'espèce végétale unitaire, possèdent la plus grande biodiversité. La spécificité du peuplement par espèce végétale permet une utilisation orientée des différentes essences.

Prenons l'exemple du verger de poirier. Cette culture est confrontée au problème du psylle *Cacopsylla pyri* qui en est le ravageur-clef. Pour étoffer la population des antagonistes de ce phytophage, nous allons choisir des essences qui hébergent des psylles spécifiques sans danger pour le poirier, mais qui de ce fait entretiennent aussi des auxiliaires qui nous intéressent. Plusieurs candidats sont possibles. Nous excluons l'aubépine, qui héberge des psylles, mais aussi des phytophages et maladies communs avec le poirier (même famille). En revanche le laurier ou le frêne sont botaniquement éloignés du poirier et hébergent chacun une ou plusieurs espèces de psylles spécifiques. Ils ont des corrélations avec le poirier pour les auxi-

liaires, mais pas pour les phytophages.

Les psylles du poirier sont également consommés par des prédateurs à plus large régime alimentaire (coccinelles, chrysopes, syrphes...). Aussi pouvons-nous retenir des essences comme le noisetier, le sureau, le tilleul, le lierre qui fourniront des auxiliaires actifs à la fois contre les psylles et les pucerons du poirier.

Parmi les essences présentant un intérêt vis à vis du poirier, un certain nombre est retenu pour leur calendrier de développement (phénologie) ou leurs caractères structuraux particuliers qui leur confèrent un rôle sur la faune utile à une époque donnée de l'année. Un assortiment végétal est ainsi établi afin de renforcer l'enchaînement des fonctions qu'un environnement

naturel non déficient exerce normalement en faveur des auxiliaires tout au long de l'année. Nous présenterons ce cycle annuel en commençant par l'automne :

- nourriture de pré-hivernation : par sa floraison tardive nectarifère et pollinifère, le lierre assure à de nombreux auxiliaires une nourriture de pré-hivernation.

- abri hivernal : de nombreuses espèces à feuilles persistantes sont choisies par les insectes pour l'hivernation. Parmi ces plantes, la viorne-tin et à nouveau le lierre : beaucoup d'insectes attirés par sa floraison l'adopteront aussi comme abri.

- nourriture de post-hivernation : les premières floraisons (mars) jouent, sur les auxiliaires qui sortent d'hivernation, un rôle très important en fournissant une nourriture indispensable à une

époque où les proies animales sont encore rares. Nectar et pollen contribuent à augmenter la fécondité et la longévité des adultes post-hivernants, et ont donc un impact direct sur le potentiel biotique des auxiliaires. Nous retenons surtout la viorne-tin, le nerprun alaterne ou le saule.

Par ailleurs, les auxiliaires s'établissent précocement sur les plantes qui hébergent des ressources exploitables pour leur descendance. Leur intérêt dans une haie est de permettre l'établissement de la ou des premières générations d'auxiliaires qui peuvent difficilement avoir lieu dans le verger lui-même en raison du caractère quasi-inévitable de certaines interventions de fin d'hiver et de printemps. Ces plantes ont ainsi l'intérêt de sédentariser les adultes et de multiplier leur effectif selon les années par un facteur 5 à 10 ou même davantage. Nous retenons certaines salicacées pour leurs pucerons : le lierre, le sureau, le noisetier, le tilleul, et le buis, l'alaterne, le laurier avec leurs psylles spécifiques.

En ce qui concerne les migrations de populations, nous illustrerons ce cas par l'arbre de Judée, espèce naturalisée chez nous avec son phytophage associé, le psylle. Ce psylle possède la particularité de migrer brutalement en mai-juin, vidant l'arbre de Judée et contraignant les auxiliaires à fuir et à rechercher d'autres arbres hébergeant des psylles. Or ce phénomène se produit à l'époque d'apparition du risque de pullulation du psylle en verger de poirier. Le lâcher automatique des entomophages a donc lieu au moment opportun : une certaine proportion d'arbres de Judée pourra ainsi être prévu dans les haies de vergers de poiriers.

Des études statistiques montrent une relation entre la pilosité des feuilles (noisetier) et la richesse en prédateurs. À la lumière des travaux de certains acarologistes, l'explication

semble être la rétention de pollen par les végétaux à feuilles pileuses : ce pollen serait utilisé comme source de nourriture par certains prédateurs dont les populations seraient favorisées par les végétaux possédant des structures foliaires adaptées à cette fin.

Parmi les pollens retenus par les feuilles pileuses, figurent ceux des conifères, qui en répandent massivement. D'où l'idée d'associer à des feuillus pileux des conifères tels que le cyprès de Provence.

Il est important qu'il n'y ait pas de rupture dans l'enchaînement des fonctions de la haie sur les populations d'auxiliaires au cours du cycle : si l'on attire les insectes en arrière-saison et si on leur procure des sites d'hivernation sans penser à assurer la nourriture des post-hivernations par exemple, on perd le bénéfice de l'essentiel de la population que l'on avait réussi à attirer. Il est important aussi d'arriver à constituer un milieu cohérent et fonctionnel avec un nombre raisonnable d'essences de l'ordre d'une dizaine. Il y a là des raisons biocénotiques, l'augmentation du nombre des essences accroît les risques dus aux phytophages, et des raisons pratiques, il faut que l'assortiment végétal reste facilement réalisable sans devenir une collection botanique.

Les systèmes de gestion des cultures réservent désormais une part prépondérante aux processus naturels de régulation. Un choix des essences végétales tenant compte des principes de base d'un aménagement raisonné de l'environnement des cultures favorise spécifiquement les auxiliaires recherchés sans accroître les risques dus aux phytophages. Cette technique de lutte par conservation de la biodiversité privilégie l'utilisation des auxiliaires à la manière d'une ressource naturelle gratuite et renouvelable. ■

**René RIEUX**  
(Inra, Avignon - 84)

## La biodiversité fait son marché en Arles

**S**eptembre 1996, Arles devient la capitale de la biodiversité méditerranéenne. C'est à cette époque qu'est organisé, durant 10 jours, le premier marché de la biodiversité, à l'instigation de Page Provence (Patrimoine génétique de la région Provence) et de Remerge (Réseau méditerranéen de ressources génétiques). Une foule nombreuse (plus de 16 000 visiteurs) s'est pressée pour venir admirer, toucher, goûter et acheter un patrimoine culinaire qui était tombé dans l'oubli, et pour redécouvrir la culture méditerranéenne représentée par des exposants venus de différents pays. On y trouvait toutes sortes de produits insolites et surprenants, souvent tombés dans l'oubli : tomates noires, carottes violettes, horchatas de chufas d'Espagne, melon serpent tunisien, haricot du désert d'Algérie, pistachier lenstique, huile d'argan marocaine... En tout 400 variétés de légumes, de fruits et d'arbustes.

Le but de cette manifestation était d'une part de relancer la consommation de ces produits en voie de disparition, mais aussi d'aider le public à mieux percevoir les enjeux de la biodiversité. C'est dans ce but que des ateliers de réflexion animés par des scientifiques ont été organisés parallèlement au marché pour débattre des questions de fonds : quels sont les risques dus au fait que 80% des besoins alimentaires de l'homme dépendent d'une trentaine de plantes seulement ? Comment trouver un équilibre entre la mondialisation des échanges et le maintien vital de la diversité végétale ?

Le bassin méditerranéen, qui compte environ 25 000 espèces végétales supérieures, soit 10% de la flore supérieure mondiale, est l'un des cinq ensembles les plus menacés de destruction. Toute cette richesse disparaîtra sans une prise de conscience du public et sans des mesures de sauvegarde. Saluons donc le travail de sensibilisation effectué par les associations qui ont organisé ce marché, et qui poursuivent leur action. ■

**Michèle BARRIERE**  
(Page Provence, Arles - 13)

# Le bilan nature en Mayenne

Trois objectifs ont été assignés à ce bilan nature : identifier avec les agriculteurs des pratiques agricoles productrices de nature, mettre au point un diagnostic simplifié d'aide à une gestion agro-écologique et permettre un travail en commun entre paysans et protecteurs de la nature.

**S**e situant dans une logique de travail commun agriculteurs-protecteurs de la nature, MNE (Mayenne nature environnement) et Aldis (Action locale pour un développement international solidaire) concrétisent cette volonté par la recherche d'une méthodologie permettant d'identifier des pratiques agricoles productrices de nature.

Axée sur le réseau Fevad (Fermes évoluant vers l'agriculture durable), la méthode a été expérimentée sur cinq exploitations mayennaises en 1994 et trois exploitations en 1995.

## Des pratiques productrices de nature

Une ferme est un ensemble de parcelles, d'espaces délimités par des haies, des clôtures, des ruisseaux... Cette portion de territoire distingue des espaces producteurs de matières agricoles. La richesse biologique de ces différents espaces est étroitement liée. Ces terrains producteurs de matières premières agricoles peuvent et doivent produire

de la nature. C'est à dire permettre à des organismes vivants (animaux, végétaux autres que ceux destinés à la production) d'être présents et d'exercer leurs fonctions.

Un diagnostic simplifié évalue la qualité du bocage présent sur ces fermes à la fois dans sa structure, dans sa composition et dans sa diversité biologique. Des indicateurs simples facilement repérables doivent émerger de ces diagnostics, permettant une application rapide sur d'autres secteurs, d'autres régions.



St-Georges sur Erve. Bocage assez préservé.



Villepail. Bocage dégradé.

## La méthode de bilan nature

Nous avons élaboré une grille de lecture du bocage intégrant la qualité structurelle de celui-ci, sa diversité fonctionnelle et la diversité biologique présente.

Huit exploitations du réseau Fevad ont été proposées par Aldis. Nous avons dressé une carte d'exploitation et nous avons parcouru les haies de la ferme ainsi que les éléments de diversité tels que les ruisseaux et les bosquets.

Une analyse de la structure du bocage et de sa diversité est proposée aux agriculteurs.

La structure du bocage prend en compte le linéaire de talus à l'hectare, la qualité brise-vent, l'action anti-érosive liée à l'implantation, l'action sur l'écoulement de l'eau.

La diversité étudiée détermine les espèces d'arbres et d'arbustes présentes sur les talus et délaissées, ainsi que les herbacées. Un inventaire des oiseaux nicheurs sur l'exploitation et un inventaire partiel des carabiques ont été effectués.

Synthétisés dans des indices, ces différents paramètres devraient permettre d'établir une corrélation entre la structure du groupe et sa qualité biologique.

Ce diagnostic est une phase d'inventaire. L'une des finalités fortes est de constater : soit que le bocage est satisfaisant au travers d'indices élevés de diversité biologique (nombre d'arbres, diversité ornithologique...) soit que le bocage est dégradé.


C'est là que le diagnostic prend tout son sens en permettant d'établir un programme de reconstitution du bocage que l'on pourrait soumettre au financement dans le cadre du Fonds de gestion de l'espace rural (FGER).

Les hommes et femmes de terrain que sont les paysans et les paysannes peuvent aussi reconstruire le bocage parce que c'est leur choix conscient. En ce sens ils sont les acteurs majeurs du paysage et de celui qu'ils légueront aux générations futures. ■

Bertrand JARRI

(Mayenne Nature Environnement, Laval - 53)

## Le bilan bocager : exemple sur deux fermes mayennaises



# La biodiversité dans le bocage

Les transformations récentes des exploitations agricoles et des techniques de production, et les modifications de paysage qu'elles ont entraînées sont fréquemment associées avec une perte de la biodiversité, c'est à dire une perte d'espèces de plantes et d'animaux dans les zones agricoles.

Depuis sa naissance il y a plus de 10 000 ans, l'agriculture est considérée comme l'une des principales causes de l'érosion des sols et de leur perte de fertilité, ainsi que de la régression et du morcellement des écosystèmes naturels. Bien que l'on sache maintenant qu'elle n'est pas seule en cause (rôle de la protoindustrie, de l'urbanisation...), elle est encore souvent accusée d'avoir été la cause première de la perte de diversité biologique dans nos régions. La mise en place progressive des réseaux de haies boisées, s'est accompagnée du maintien d'une diversité biologique élevée, tant que la polyculture et le polyélevage ont été dominants.

Actuellement, agriculteurs, aménageurs et administrations, sont à la recherche de nouvelles formes d'agriculture perturbant moins la faune et la flore sauvages. Depuis 1991 une équipe de chercheurs de l'Inra et du CNRS, travaille sur des sites bocagers du nord de l'Ille et Vilaine, afin de comprendre les relations entre l'agriculture et la survie des espèces pour définir un certain nombre d'actions. Une première analyse du nombre d'espèces présentes dans trois unités paysagères voisines, l'une au bocage dense, l'autre au bocage intermédiaire et la troisième au bocage résiduel, a montré que le nombre d'espèces varie peu en fonction de l'ouverture du paysage, si ce n'est pour les oiseaux nicheurs et les moucheron (diptères empididae). Cependant une

étude plus détaillée des peuplements animaux et végétaux montre que certaines pratiques agricoles et la disparition des haies ont un rôle sur le maintien des espèces. Si le nombre d'espèces varie peu, ce ne sont pas toujours les mêmes espèces qui sont présentes. Le bocage ouvert abrite plutôt des espèces très répandues, peu exigeantes. Les paysages agricoles sont hétérogènes, des espaces cultivés de manière plus ou moins intensive voisinent avec des prairies permanentes et des zones d'inculture : bois, haies, landes... La plupart des espèces animales doivent utiliser plusieurs éléments du paysage au cours de leur cycle de vie, et sont donc sensibles à l'organisation spatiale du paysage. Les pratiques agricoles dans les champs cultivés et les pratiques de gestion dans les zones incultes (entretien des haies) déterminent la qualité des habitats rencontrés par les différentes espèces : ressources alimentaires, microclimat, structure de la végétation, ... Nous avons mis en évidence l'influence de ces deux types de facteurs, sur les populations animales ou végétales.

## Le rôle de la structure du paysage

Le bocage se caractérise par la présence d'un certain nombre d'espèces forestières, plantes ou animaux, qui ne sont généralement présentes que dans les bosquets et les haies. La continuité du réseau est indispen-

sable pour permettre aux individus de se déplacer d'un habitat favorable à l'autre, et assurer ainsi le maintien des populations en ce qui concerne les animaux, et permettre la propagation des graines pour les plantes. Le bocage joue alors un rôle de couloir, de «corridor», favorisant le mouvement et les échanges. Cet effet a été montré pour des insectes coléoptères carabiques, des petits rongeurs et même un oiseau, le grimpereau, qui se déplace de tronc en tronc, avec une faible capacité de vol.

## La qualité des habitats

Les cultures adjacentes aux haies définissent les ressources trophiques de nombreuses espèces d'oiseaux

Les haies larges bordées par des prairies permanentes contiennent un plus grand nombre d'espèces que celles qui sont bordées de labours ou de prairies de courte durée. Par contre, les haies bordées de parcelles cultivées des deux côtés sont plus fréquentées par les musaraignes ou les campagnols, qui se nourrissent dans les cultures en saison de végétation. Un suivi mensuel de l'entretien des bords de champ sur 150 haies, a montré la grande variabilité tant spatiale que temporelle des techniques employées par les agriculteurs. Quelques tendances ont cependant pu être mises en évidence : l'usage des herbicides est de plus en plus fréquent d'une année à l'autre, la date et la technique

choisies par l'agriculteur dépendent de la culture adjacente à la haie. Dans le cas d'un maïs par exemple, l'entretien se fait par herbicide vers le mois de juin, donc avant la floraison. Ceci a un impact négatif pour l'ensemble des insectes floricoles, dont les bourdons et les papillons qui se nourrissent essentiellement dans cette zone.

L'entretien plus ou moins important de la strate arbustive des haies définit l'ensoleillement, le dérangement par le vent... Tous ces facteurs influencent la présence d'insectes tels que les coléoptères carabiques forestiers qui ont besoin d'ombre et d'une végétation dense. La survie au niveau du paysage dépend, nous l'avons vu plus haut de la connectivité du réseau, mais aussi de la qualité de la végétation des haies.

L'agriculture intervient sur la biodiversité à la fois par la structure du paysage qu'elle engendre : taille des parcelles, nature des cultures, importance du réseau de haies, et par les pratiques au niveau local : entretien des haies, épandage d'intrants,...

Bien que la réponse des espèces à ces deux niveaux ne soit pas unique et dépende de leurs caractéristiques biologiques, un certain nombre de recommandations peuvent être tirées de nos travaux :

- il faut assurer au maximum une continuité des zones incultes : haies, bois, chemins
- l'entretien des bords de champs doit se faire le plus tard possible dans la saison
- la gestion de la strate arbustive ne doit pas se faire de façon trop drastique
- les prairies permanentes jouent un rôle important, complémentaire souvent de celui des haies. ■

Françoise BUREL  
et Jean-Claude LEFEUVRE  
(CNRS, Rennes - 35)

# Au secours d'une vache bretonne

Localement, des éleveurs réagissent à la menace qui pèse sur les races « locales » ou « rustiques ». Ils se sont structurés en groupes de défense. Celui de la Bretonne Pie Noire est un des premiers.

Lorsque l'on fait allusion à la biodiversité, on pense souvent aux espèces sauvages. Pourtant, la diversité génétique, animale ou végétale, se raisonne aussi au niveau des espèces domestiques. Des conditions particulières d'élevage, de climat, et le travail de sélection opéré pendant des siècles avait conduit à la formation d'un grand nombre d'espèces locales parfois très différentes selon les régions. Cette diversité, bien éloignée des préoccupations actuelles de l'agriculture productiviste, a dorénavant valeur de vestige. Le développement des échanges interrégionaux et internationaux, et la recherche de rendements toujours plus élevés, a considérablement appauvri notre pays en terme d'espèces dites « locales ou rustiques ». Pourtant celles-ci sont garantes d'un patrimoine génétique phénoménal qui, s'il paraît inutile aujourd'hui, pourrait s'avérer essentiel à l'avenir. En effet, une réduction du patrimoine génétique rend les espèces très vulnérables à d'éventuels changements des conditions du milieu. L'affaire de la « vache folle » est là pour nous rappeler combien le système agricole actuel peut être fragile. Ainsi, les organisations nationales et internationales ont mis en place des programmes de sauvegarde de ces espèces menacées grâce à des « banques de gènes ». La Communauté européenne propose aussi des subventions aux éleveurs de races locales menacées dans le cadre des Mesures agri-environnementales.

« Petite mais costaud »



La Bretonne Pie Noire est la plus petite race bovine française (1 mètre 17 au garrot). Elle a été façonnée par des conditions de vie diffi-

ciles en terrains granitiques acides et pauvres en phosphore. Elle est parmi les races rustiques ayant le mieux conservé leurs caractères originels, car l'impact des croisements fut relativement faible au siècle dernier.

Les qualités de cette race sont de trois ordres :  
- une production laitière honorable comptenu du format : en moyenne 3 525 kg/an (moyenne 1988).

- un lait de qualité (taux butyreux = 43‰, taux protéique = 33‰).

- des qualités d'élevage uniques : précocité sexuelle (vêlage à 2 ans) ; longévité (souvent 6, et jusqu'à 12 ou 13 lactations) ; rusticité et adaptabilité de la race (résistance aux conditions de milieu, pas de problèmes au vêlage...).

## 1976 : un appel « à la rescousse »

Le cheptel des Bretonnes Pie Noires comptait plus de 500 000 têtes à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle. Elles furent peu à peu remplacées par les Frisonnes et les Holsteins. C'est vers la fin des années 70 qu'un plan de sauvegarde a été mis en place pour éviter la disparition de la race, qui paraissait alors irrémédiable.

Le but du Plan de Sauvegarde était de maintenir un effectif de 300 vaches en race pure, en évitant la consanguinité. Pour se faire, des contrats furent passés avec 47 éleveurs qui s'engagèrent à maintenir leur cheptel. Le groupe de vaches fut divisé en huit familles, ainsi que les taureaux. À partir de ces familles, un programme de reproduction fut proposé.

1990 marque un tournant avec l'implication du Parc Naturel Régional d'Armorique dans les actions de sauvegarde des espèces domestiques bretonnes (Bretonne Pie

Noire, Froment, Armoricaire, Nantaise, porc Blanc de l'Ouest, mouton d'Ouessant). L'embauche d'un animateur, la création d'un centre d'élevage de reproduction de BPN en plus du troupeau « vitrine » de Menez-Meur, l'organisation du concours BPN (arrêté en 1965) sont autant de facteurs propres à dynamiser la sauvegarde de la BPN.


Depuis 1993, la progression des effectifs est de 8 à 10% l'an. Les 800 têtes devraient être dépassées en 1997. Notons que le quart des éleveurs, propriétaire de la moitié du cheptel, est en production laitière transformée à la ferme. Le système allaitant (60% des éleveurs, 40% du cheptel adulte) connaît un développement souvent lié à la pluriactivité.

Pour la première fois depuis 1975 des éleveurs ont témoigné sur leurs résultats économiques et ont fait la démonstration de la rentabilité du système laitier en fabrication fermière avec la Bretonne Pie Noire (valorisation du litre de lait entre 7 et 10 F du litre, EBE représentant 35% et 52% du chiffre d'affaires dans l'un et l'autre des deux témoignages). La preuve est faite : en transformation fermière, la BPN est particulièrement bien adaptée. Son lait, riche du variant c de la caséine B convient bien pour la fabrication de fromage.

Balayées par le vent de « modernité » des années 60 (elles incarnaient peut-être un passé parfois difficile), les races locales, quand elles n'ont pas disparu, refont surface, cherchent et parfois retrouvent une petite place au soleil. Elles méritent l'attention des pouvoirs publics, mais aussi des éleveurs sans lesquels, c'est bien connu, il n'y a pas d'élevage. ■

Jacques COCHY

(éleveur de Bretonnes Pie Noires, Donges - 44)



# Une méthodologie venue d'outre-Manche

Paul Cobb, conseiller du groupe britannique FWAG (Farming and wildlife advisory group) dans le Kent, a passé deux jours en Anjou pour réaliser des diagnostics de biodiversité sur des exploitations agricoles.



## Pourquoi avoir choisi de réaliser des diagnostics de biodiversité en France ?

J'ai une bourse du Canterbury Farmers Club pour visiter des fermes en Europe qui travaillent sur la production intégrée en grandes cultures, fruit, légumes et vigne. C'est ainsi que j'ai visité deux exploitations du réseau Farre (qui est l'allié du LEAF - Linking environnement and farming avec lequel FWAG travaille) dans les Côtes-d'Armor. Les deux agriculteurs étaient maraîchers (surtout choux-fleurs et artichauts). J'ai trouvé chez eux des pratiques raisonnées qui m'ont impressionné : allongement des rotations, replantation des haies, ajustement et dosage de la fertilisation etc... C'est aussi à l'occasion de ces visites que les Civam, qui collaborent avec nous dans le cadre d'un programme européen sur l'agriculture durable m'ont proposé de réaliser des diagnos-

tics de biodiversité sur trois fermes du Civam Agriculture Durable de Maine-et-Loire.

## Comment se sont déroulées les visites de ces fermes ?

Ces visites de «premier contact» se sont déroulées de la même façon qu'en Angleterre, avec l'objectif de discuter des principales caractéristiques de l'exploitation, de leur valeur pour la biodiversité et comment le système agricole pourrait être géré pour favoriser la vie sauvage. Le principe de FWAG est avant tout de partir de la situation de l'exploitation telle qu'elle est, pour encourager les bonnes pratiques quand elles sont présentes, et faire évoluer l'agriculteur petit à petit. C'est un travail à long terme et une relation suivie d'assistance et de confiance mutuelle avec l'agriculteur.

## Que pensez-vous des exploitations que vous avez visitées ?

Tout d'abord, les trois agriculteurs étaient très aimables et accueillants ! Et particulièrement ouvert à l'intervention d'une organisation extérieure. De plus, ils étaient tous trois clairement engagés dans l'agriculture durable. Les exploitations se situaient dans des cadres accueillants et possédaient des potentiels de biodiversité intéressants. Le système agricole mis en place vise à réduire les intrants

et à extensifier, de façon à ce que son impact sur l'environnement soit diminué au fil du temps. Il est intéressant pour nous en Grande-Bretagne, de constater que le principal critère de durabilité est l'augmentation de la pâture et la diminution du maïs ensilage dans la ration. Etendre la durée de pâture est aussi devenu un objectif pour nous depuis que, récemment, des conseillers de Nouvelle-Zélande sont venus promouvoir une meilleure utilisation du pâturage.

## Que dire du mode de gestion des milieux naturels que vous avez pu trouver ?

Les problèmes sur le terrain sont très similaires à ceux que l'on peut trouver en Grande-Bretagne : la gestion et la plantation de haies, la gestion des bordures de parcelles, les mares et zones humides, ruisseaux, prairies... Les trois fermes que j'ai visitées ont cependant fait beaucoup d'efforts pour la replantation des haies. J'ai été surpris de voir que chacune avait disposé des fils électriques pour protéger les haies du bétail. Une pratique que j'aimerais voir adopter par plus d'exploitants en Angleterre !

Un des principaux potentiels de biodiversité reste pour les trois fermes la présence de vieilles prairies permanentes. Ces types de prairies sont riches en espèces de toutes sortes (fleurs, insectes) et sont devenus très rares dans les systèmes actuels.

Un des agriculteurs que j'ai rencontrés possédait une prairie médiocre en production, mais qui s'est révélée être un site de nidification pour les alouettes. Il est vrai que dans ce type de situation, le choix va souvent vers l'intérêt économique et le retournement de la parcelle.

## Quel avenir voyez-vous aux problèmes de biodiversité dans le secteur agricole ?

Le besoin en conseils de base, accessibles et pas trop chers, sur la gestion des habitats m'est apparu de façon relativement forte sur les exploitations que j'ai visitées. Les trois agriculteurs étaient relativement bien informés, mis à part sur quelques thèmes spécifiques développés par FWAG (gestion des bordures de parcelles, conservation du lierre sur les arbres...). L'aide de spécialistes en plantation de haies leur a été utile, mais le besoin en conseil sur la gestion de l'espace reste relativement important. En Angleterre, il existe des subventions au travers du Countryside Stewardship Scheme pour la gestion des prairies et des haies. Ces aides sont relativement incitatives. Peut-être faudrait-il s'en inspirer en France ? ■

Emmanuel LOUZIE

(FRCIVAM Pays de la Loire, Nozay - ...)

## GLOSSAIRE :

- agrosystème** : écosystème soumis à l'intervention de l'activité agricole.
- anthropisation** : modification du milieu sous l'effet de l'action humaine.
- auxiliaires** : se dit d'animaux présents naturellement ou introduits qui, par leur présence, interviennent dans la protection des cultures contre les ravageurs.
- biocénose** : relatif à la biocénose, qui est l'association équilibrée d'êtres vivants dans un même milieu.
- biosphère** : ensemble des êtres vivant à la surface du globe terrestre.
- carabiques** : famille d'insectes de l'ordre des coléoptères comportant de nombreuses espèces. Ce sont des prédateurs pourvus de grandes pattes et de puissantes mandibules.
- cécidomyie** : insecte de l'ordre des diptères (mouches, moustiques). Les larves de certaines espèces sont nuisibles au seigle et au blé.
- chrysope** : famille d'insectes de l'ordre des neuroptères dont les larves consomment surtout des pucerons.
- écosystème** : ensemble des êtres vivants et des éléments non vivants, aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, lac, champ, etc.).
- psylle** : petit insecte de l'ordre des homoptères (cigales et pucerons). Les larves du psylle peuvent causer beaucoup de dégâts sur les vergers.
- syrrphe** : famille d'insecte de l'ordre des diptères (mouches, moustiques). les adultes se nourrissent de nectar et les larves de certaines espèces sont prédatrices d'autres insectes.
- trophique** : relatif à la nutrition d'un être vivant.

## La méthode Landwise (TRI 100)

La méthode Landwise est une méthode de conseil en agri-environnement mise au point par FWAG. Elle propose des programmes de gestion du milieu naturel en considérant l'exploitation dans sa globalité. Le diagnostic est réalisé en trois étapes :

- à la demande de l'agriculteur, le conseiller de FWAG fait une première visite gratuite pour évaluer l'impact environnemental de l'exploitation.
- dans un deuxième temps, un plan de développement qui prend en compte les priorités environnementales et les contraintes du système est proposé à l'agriculteur.
- pour les agriculteurs qui le souhaitent, une analyse plus poussée, la troisième étape, permet de recenser les espèces animales et végétales présentes sur l'exploitation et de construire un plan de gestion détaillé. ■